外臺秘要方卷第三十三 婦人上三十七門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

求子法及方一十二首
久無子方五首
養胎法并禁忌一十三首
姙娠隨月數服藥及將息法一十九首
姙娠嘔吐及惡食方九首
姙娠胎動方九首
動胎腰腹痛方三首
頓仆胎動方四首
胎數傷及不長方三首
姙娠傷寒方四首
姙娠患瘧方二首

靜嘉堂文庫所藏

妊娠下痢方四首
妊娠心痛方八首
妊娠腹痛方三首
妊娠漏胞方五首
妊娠下血及尿血方七首
妊娠小便不通利方五首
妊娠子淋方五首
妊娠大小便不利方五首
妊娠子癎方二首
妊娠水氣方三首
損娠方六首
數墮胎方四首
妊娠得病欲去子方三首
落胎去胎方四首
產乳序論三首
年立成法一首
十二月立成法一首 并圖
推日遊法一首 并圖
體玄子爲產婦借地法一首
日曆法二首
安置產婦法二首
產難方二十四首
逆產方一十二首
橫產方四首
子死腹中欲令出方一十五首
胞衣不出方二十首

靜嘉堂文庫所藏

求子法及方一十二首

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎姙生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論生熟二藏虛實交錯惡肉內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或行步風來便利於懸廁之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也唯懷胎姙孕而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以爲病根深療之難差故養生之家特須教子女學此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明於此則何以免其夭橫者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不意也

又論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昬爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相剋及與刑煞衝破并在子休廢死墓中生者則求子了不可得愼無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍

靜嘉堂文庫所藏

須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣禁

忌法

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘂聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絶一日三日五日爲男仍遇月宿在貴宿日又以夜半後生氣時寫精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以經絶後二日四日六日寫精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十二日二十七日

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十二日二十八日

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五日
十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日
六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日二十
七日二十八日二十九日
七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日二十六
日二十七日二十九日
八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十三日
二十四日二十五日二十六日
九月三日六日十一日十六日十九日二十日二十一日二十
二日二十四日
十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二
十二日二十九日
十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九
日二十六日二十九日
十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日二十四日
二十七日
若春合甲寅乙卯　夏合丙午丁巳　秋合庚申辛酉
冬合壬子癸亥
與上件月宿日合者尤佳出第二卷中
千金翼論曰夫求子者服藥須有次第不得不知其次第謂男
服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得効
矣不知此者得力鮮焉出第五卷中其七子散盪胞湯紫石
門冬丸在次下千金并翼方中
廣濟療無子令子宮內灸丸方
麝香二分研　皂莢十分塗酥炙削去黑皮子　蜀椒六分汗
右三味擣篩蜜丸酸棗人大以綿裹內產宮中留少綿線出

靜嘉堂文庫所藏

覺憎寒不淨下多即抽綿線出却丸藥一日一度换之無間晝夜皆内無所忌

又方

蛇牀子　石鹽　細辛　乾薑

土瓜根各四兩

右五味擣散取如棗核大以綿裹内子宫中以指進之依前法中間病未可必不得近丈夫餘無所忌並出第三卷中

又療婦人百病斷絶緒産白薇丸方

白薇　細辛　厚朴炙　椒汗

桔梗　鼈甲炙各五分　防風　大黄

附子炮　石硫黄各六分研　牡蒙二分　人參

桑上寄生各四分　半夏洗　白殭蚕　續斷

秦艽　紫菀　杜蘅　牛膝

蝱蟲去翅足熬　水蛭各二分熬　紫石英研　朴消

桂心　鍾乳　當歸各八分

右二十七味擣篩蜜丸空腹温酒服如梧桐子十五丸日二漸加至三十丸不吐不利忌生冷油膩餳生血物人莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭出第二卷中

千金七子散療丈夫風虚目暗精氣衰少無子補不足方

五味子　牡荆子　菟絲子　車前子

乾地黄　署預　石斛　杜仲

鹿茸炙　遠志去心　菥蓂子各八分　附子炮

蛇牀子　芎藭各六分　山茱萸　天雄炮

黄耆　人參　茯苓　牛膝各五分

桂心十分　巴戟天十二分　蓯蓉七分　鍾乳三分

右二十四味擣篩爲散酒服方寸匕日二服不知增至二匕

以知爲度忌生冷酢滑猪雞魚蒜油膩不能酒者蜜和丸服

亦佳行房法一依素女經女人月信斷一日爲男二日爲女三日爲男四日爲女已外無子仍每日午時前半夜後陽時爲男下精欲得去玉門入半寸不爾過子宮一方加覆盆子八分翼經心録并翼同忌蕪荑生葱

又朴消盪胞湯療婦人立身已來全不生及斷緒久不産三十年者方

朴消　牡丹　當歸　大黄

桃人（去皮尖生用各三兩）　細辛　厚朴（炙）　桔梗

芍藥　人參　茯苓　桂心

甘草（炙）　牛膝　橘皮（各二兩）　䗪蟲（去翅足微熬）

水蛭（炙各六十枚）　附子（一兩半炮）

右十八味切以清酒五升水六升合煑取三升分四服日三夜一每服相去三辰少時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本爲婦人子宮内有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調爲有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥翼方無桔梗甘草並出第二卷中

千金翼坐導藥方

皂莢（一兩炙去皮子）　大黄　戎鹽　礬石（燒）

當歸（各二兩）　五味子　乾薑（各三兩）　細辛（三兩）

蜀椒（汗二兩）　葶藶子　苦瓠（各三分千金作山茱萸）

右十一味擣篩内輕絹袋子如中指許大長三寸盛之令滿内子門中坐任意勿行走急小便時即出之仍易新者一日

靜嘉堂文庫所藏

當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出亦可
至十日安之千金無葶藶一方又有砒霜三分廣濟同著藥
後一日乃服紫石門冬丸其方如左

紫石英七月研之　天門冬各三兩去心　紫葳　甘草炙
桂心　牡荊子千金作牡蒙　烏頭炮　乾地黃
辛夷人　石斛　卷柏　禹餘糧
當歸　芎藭各三兩　烏賊魚骨　牛膝
署預各六分　桑寄生　人參　牡丹
乾薑　厚朴炙　續斷　食茱萸
細辛各五分　柏子人一兩

右二十六味擣篩蜜和酒服十丸如梧桐子日三稍加至三
十丸慎如藥法經心錄同並出第五卷中

延年療婦人子藏偏僻冷結無子坐藥方

蛇牀子三兩　芫花三兩

右二味擣篩取棗大紗袋盛內產門中令没指袋少長
作頃去任意卧著慎風冷出第四卷中

久無子方五首

廣濟療久無子白薇丸方

白薇　牡蒙　藁本各五分　當歸
乾地黃各七分　芎藭　人參　柏子人
石斛　桂心　附子炮　五味子
防風　吴茱萸　甘草炙　牛膝
桑寄生各六分　薑黃七分　禹餘糧八分　秦椒二分汗

右二十味擣篩蜜丸如梧桐子空腹酒下二十丸加至三十丸
日再服不利忌生葱生菜熱麪蕎麥猪肉葵菜蕪荑菘菜
海藻粘食陳臭物等

靜嘉堂文庫所藏

又療久無子斷緒少腹冷疼氣不調地黃湯方

乾地黃 牛膝 當歸各八兩 芎藭

卷柏 防風各六分 桂心 牽牛子末各三分

右八味切以水六升煑取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛子末服如人行四五里更進一服以快利止忌熱麪蕎麥炙肉生葱蕪荑蒜粘食等物出第三卷中

千金療月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子金城太守白薇丸方

白薇 細辛各五分 人參 杜蘅

厚朴炙 牡蒙 半夏洗 白殭蚕

秦艽 當歸 紫菀各三分 牛膝

沙參 乾薑各二分 蜀椒汗 附子炮

防風各六分 古今錄驗不用杜蘅用牡蠣三分熬

右十七味末之蜜和丸先食服如梧桐子三丸不知稍增至四五丸此藥不長將服覺有身則止用大驗忌餳猪羊肉冷水生葱生菜延年同崔氏有桔梗丹參各三分出第二卷中

千金翼白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療之方

白薇 車前子各三分 當歸 芎藭

蛇牀子各四分 紫石英 菴䕡子 石膏

藁本 卷柏各五分 澤蘭 太一禹餘糧

覆盆子 桃人熬 白芷 麥門冬去心

人參各六分 桂心 蒲黃各十分 細辛

乾薑 乾地黃 椒汗各二分 茯苓

赤石脂 遠志去心 白龍骨各八分 橘皮二分

右二十八味擣篩爲末蜜和酒服十五丸如梧桐子日再增至四十丸以知爲度亦可至五十丸愼猪雞魚蒜生冷酢滑生葱

靜嘉堂文庫所藏

生菜蕪荑驢馬等肉覺有身則止藥秘之勿妄傳也出第五卷中

經心録茱萸丸療婦人陰寒十年無子方

吴茱萸一升 蜀椒一升去目汗末

右二味蜜丸如彈子丸綿裹導子腸中日再易無所下但開子藏令陰温即有子也出第六卷中

養胎法并禁忌一十三首

千金論曰舊説凡受胎三月逐物變化稟質未定故姙娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和性情節嗜慾庶事清靜生子皆良長壽忠孝仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教者也

又論曰兒在胎日月未滿陰陽未備府藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

又姙娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

又姙娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

又姙娠食雀肉并豆醬令子滿面皯䵟黒子

又姙娠食山羊肉令子多病

又姙娠食兎犬肉令子無音聲并缺脣

又姙娠食椹并鴨子令子倒出心寒

又姙娠食驢馬肉延月

又姙娠食騾肉難產

又姙娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

又姙娠勿向非常之地大小便必半產殺人

又姙娠勿食羊肝令子多厄

又姙娠勿食鼈令兒短項

又姙娠食氷漿絶產並出第二卷中

静嘉堂文庫所藏

姙娠隨月數服藥及將息法一十九首

千金姙娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥
辛是謂才正
又姙娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經足厥陰内屬於肝
肝主筋及血一月之血行否澀不爲力事寢必安靜無令恐畏
又姙娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚舉重腰
痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方
烏雌雞一隻（治如食法） 茯苓（二兩） 呉茱萸（一升）
芍藥 白朮（各三兩） 麥門冬（五合去心） 人參（三兩）
阿膠（二兩） 甘草（一兩炙） 生薑（一兩切）
右十味切以水一斗二升煑雞取汁六升去雞下藥煑取
三升内酒三升并膠烊盡取三升去滓温服一升日三服
又若曾傷一月胎者當預服補胎湯方
細辛（一兩） 防風（二兩） 烏梅（一升） 呉茱萸（五合）
乾地黄 白朮（各二兩） 大麥（五合） 生薑（四兩）
右八味切以水七升煑取二升半去滓分温三服若寒多者
倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加括樓根二兩若有
所思去大麥加柏子人三合忌生菜蕪荑桃李雀肉等物一
方人參一兩
又姙娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆
痛是謂胎始結
又姙娠二月足少陽脉養不可鍼灸其經足少陽内屬於膽
主精二月之時見精成於胞裏當愼護驚動
又姙娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒中風寒
有所動摇心滿臍下懸急腰背强痛卒有所下乍寒乍熱艾傷
主之方

靜嘉堂文庫所藏

丹參三兩 當歸 人參 麻黃去節
艾葉 阿膠炙各二兩 甘草一兩炙 大棗十二枚擘
生薑一兩
右九味切以酒三升水一斗內藥煑減半去滓內膠煎取三
升分溫三服忌海藻菘菜
又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方
黃連 人參各一兩 吳茱萸五合 生地黃五兩
生薑三兩
右五味切以醋漿七升煑取三升分四服日三夜一每十日一
作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌
猪肉冷水蕪荑一方當歸半兩
又姙娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者
操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐

清虛是謂外象而內感者也
又姙娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主內屬於心無
悲哀無思慮驚動
又姙娠三月爲定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚
恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有
所下雄雞湯方
雄雞一隻治如食法 甘草炙 人參 茯苓
阿膠各二兩 黃芩 白朮各一兩 麥門冬去心五合
芍藥四兩 大棗十二枚擘 生薑一兩切
右十一味切以水一斗五升煑雞減半內藥煑取半內清酒
三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫卧忌海藻菘菜
酢物桃李雀肉等一方當歸芎藭二兩不用黃芩生薑
又若曾傷三月胎者當預服茯神湯方

靜嘉堂文庫所藏

茯神 丹參 龍骨各一兩 阿膠
當歸 甘草炙 人參各二兩 赤小豆二十一粒
大棗十二枚擘
右九味切酢漿一斗煑取三升分四服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩忌海藻菘菜深師有薤白二兩麻子一升
又妊娠四月始受水精以成血脉其食稻粳其羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡
又妊娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食
又妊娠四月爲離經有寒心下温温欲嘔胷膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項强痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花如雞子大一枚 麥門冬一升去心 麻黃三兩去節 阿膠三兩炙
甘草二兩炙 當歸二兩 人參一兩半 生薑五兩
半夏二兩洗 大棗十二枚擘
右十味以水八升煑減半內清酒三升幷阿膠煎取三升分三服温卧當汗以粉粉之護風寒四五日忌羊肉海藻菘菜餳等
又若曾傷四月胎者當預服調中湯方
芍藥四兩 甘草炙 芎藭 續斷各一兩
生李根白皮 柴胡 白朮各三兩 烏梅一升
當歸一兩半 生薑四兩 厚朴炙 枳實炙各二兩
右十二味切以水一斗煑取三升分四服日三夜一八日復服一劑一方半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉等物
又妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其

靜嘉堂文庫所藏

衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羮牛羊和茱萸調以五味是謂養氣以定五藏

又妊娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰内輸於脾五月之時兒四肢成無大肌無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

又妊娠五月毛髪初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方又方旋覆花湯

阿膠四兩炙　人參一兩　麥門冬一升去心　生薑六兩

吳茱萸七合　旋覆花　當歸　芍藥

甘草炙　黃芩各二兩

右十味切以清酒三升以水九升煑減半内清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三服夜一先食再服便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草炙　芍藥各三兩　當歸　人參

乾地黃　芎藭各二兩　五味子五合　麥門冬一升去心

大麻人五合　生薑六兩　大棗三十五枚擘　黃芩一兩

右十二味切以水七升清酒五升煑取三升半分四服日三夜一七日復服一劑忌菘菜海藻蕪荑

又妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋以養其力以堅背膂

又妊娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明内屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹内脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥門冬湯方

静嘉堂文庫所藏

麥門冬去心一升　甘草炙　人參各一兩　乾地黃三兩
黃芩二兩　阿膠四兩　生薑六兩　大棗十五枚擘
右八味切以水七升煑減半内清酒二升并膠煎取三升分
三服每服如人行三四里中間進糜粥忌海藻菘菜蕪荑
又若曾傷六月胎當預服柴胡湯方
柴胡四兩　芍藥一方作紫葳　白朮　甘草炙各二兩
麥門冬三兩去心　蓯蓉一兩　芎藭二兩　乾地黃五兩
生薑六兩　大棗三十枚擘
右十味切以水一斗煑取三升分四服日三夜一中間進糜
粥勿食生冷及堅强之物七日更服一劑忌海藻菘菜蕪
荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩
又妊娠七月始受木精以成骨勞身摇肢無使定止動作屈伸
以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻以密腠理是
謂養骨而堅齒
又妊娠七月手太陰脉養不可鍼灸其經手太陰内屬於肺肺
主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴
無寒飲
又妊娠七月忽驚恐摇動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒
煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背强葱白湯方
葱白長三四寸十四枚　半夏洗　麥門冬去心各一升　生薑八兩
甘草炙　當歸　黃耆各三兩　阿膠四兩
人參一兩半　黃芩一兩　旋復花一把
右十一味切以水八升煑減半内清酒三升并膠煎取四升
温服一升日三夜一温卧當汗出若不出者加麻黃二兩煑
服如前法若秋後勿强責汗忌羊肉餳海藻菘菜等
又若曾傷七月胎者當預服杏人湯方

靜嘉堂文庫所藏

杏人(去雙人皮尖碎) 甘草(炙) 鍾乳(研各二兩) 麥門冬(去心)
吳茱萸(各一升) 乾薑(二兩) 五味子 粳米(各五合)
紫菀(一兩)
右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進
食七日服一劑忌海藻菘菜
又姙娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂
密腠理光澤顏色
又姙娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明內屬於大腸
大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起
又姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常
苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰
背苦冷痛而目視茫茫芍藥湯方
芍藥(四分) 人參 當歸 甘草(炙各三兩)

白朮(一兩) 厚朴(二兩炙) 薤白(一升切) 生薑(四兩切)
右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海
藻菘菜桃李雀肉等
又若曾傷八月胎者當預服葵子湯方
甘草(三兩炙) 芍藥(二兩一方四兩) 柴胡(三兩) 葵子(二升)
白朮(三兩) 生薑(六兩) 大棗(二十枚擘) 厚朴(二兩)
右八味切以水九升煮取三升分三服日三十日服一劑忌
海藻菘菜桃李雀肉等
又姙娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食
甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力
又姙娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰內屬於腎
腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處溫冷無著炙衣
又姙娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉側短

靜嘉堂文庫所藏

氣半夏湯方

半夏洗　麥門冬去心各五合　乾薑一兩　當歸

吴茱萸　阿膠炙各三兩　大棗十二枚擘

右七味切以水九升煑取三升去滓內白蜜八合微火上溫

分四服痢即止忌生血物餳

又若曾傷九月胎者當預服猪腎湯方

猪腎一具　茯苓　桑寄生　乾薑

乾地黄　芎藭各三兩　白术四兩　麥門冬一升去心

附子中者一枚炮　大豆三合

右十味切以水一斗煑腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分

四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等

又妊娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節

人神皆備但俟時而生集驗延年同並出第二卷中

小品療妊娠五月日舉動驚愕動胎不安下在小腹痛引腰胳公洛切下也小便疼下血安胎當歸湯方

當歸　阿膠炙　芎藭　人參各一兩

大棗十二枚擘　艾一虎口

右六味切以酒水各三升合煑取三升去滓內膠令烊分三

服腹中當小便緩差也古今錄驗救急同出第七卷中

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食湯方

妊娠嘔吐及惡食方九首

青竹茹　橘皮各三兩　生薑　茯苓各四兩

半夏五兩湯洗十遍

右五味切以水六升煑取二升半分三服不差頻作忌羊肉

餳酢物等千金經心錄同

又療妊娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮　竹茹　人參　白朮各三兩

生薑四兩　厚朴二兩炙

右六味切以水七升煮取二升半分三服不差重作忌桃李雀肉等千金救急經心録同出第十一卷中

古今録驗療姙娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯方

甘草炙　柴胡各二兩　麻黄一兩去節　大棗十二枚擘

食茱萸一升

右五味切以水六升煮取三升適寒温服一升日三療食噫醋除熱下氣多所冝與上同但春秋冬夏去茱萸加枸杞一斤六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黄加乾薑一兩十月加芎藭三分忌海藻菘菜

又療惡食人參湯方

人參四兩　厚朴炙　生薑　枳實炙

甘草各二兩炙

右五味切以水六升煮取三升分三服忌海藻菘菜並出第三十四卷中

崔氏半夏茯苓湯療姙娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢百節疼煩沉重多卧少起惡寒汗出疲極黄瘦方

半夏洗　生薑各五兩　旋復花一兩　橘皮二兩

茯苓三兩　細辛　芎藭　人參

桔梗　甘草各二兩炙　芍藥二兩　乾地黄三兩

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌猪羊肉餳菘菜海藻生菜蕪荑

千金云若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩若變冷下痢者除乾地黄用桂心二兩若食少胃中虚生熱大便閟塞小便赤

靜嘉堂文庫所藏

少者加大黃三兩除地黃加黃芩一兩餘依方服一劑得下後
消息看氣力冷熱更增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸
令能食便強健也
又茯苓丸療妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔
逆吐悶顛倒四肢垂重不自勝持服之即効要先服半夏茯苓
湯兩劑後可將服茯苓丸方

茯苓　人參各一兩　桂心熬　橘皮
白朮　甘草炙　葛根熬　乾薑
半夏洗　枳實炙各二兩

右十味擣篩蜜和丸如梧桐子大飲服二十丸漸至三十丸
日三千金同忌海藻菘菜羊肉餳桃李雀肉酢等肘後只五味又
云妊娠忌桂後熬

又療妊娠常苦煩悶此子煩也竹瀝湯方

竹瀝三兩　防風　黃芩　麥門冬去心各三兩
茯苓四兩

右五味切以水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差重作忌酢物

又方

時時服竹瀝隨多少出第十卷中

近効療妊娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐方

青竹茹　麥門冬去心各三兩　前胡二兩
陳橘皮一兩炙令黃焦香氣出佳　蘆根一握取肥白嫩者

右五味切以水二大升煮取半大升去滓分再服食後一服
無麥門冬用小麥三合煮之勿令裂即熱四肢煩蒸者加地
骨皮醫人夏侯拯錄

妊娠胎動方九首

廣濟主安胎胎病漏肚痛方

當歸　芎藭　阿膠炙　人參各一兩

靜嘉堂文庫所藏

大棗十二枚擘
右五味切以水三升酒四升合煑取二升半分三服五日一
劑頻服三四劑無所忌出第三卷中
小品療姙娠重下痛引腰背安胎止痛湯方
當歸　膠炙　乾地黃　黃連
芍藥各一兩　雞子一枚　秫米一升
右七味切以水七升攪雞子令相得煑秫米令如蟹目沸
去滓內諸藥煑取三升分四服忌蕪荑經心錄同
又膠艾湯療損動毋去血腹痛方
膠一斤炙　艾葉一筥
右二味以水五升煑取二升半分三服出第七卷中經心錄同
集驗療姙娠胎動不安腹痛葱白湯方
葱白切一升　阿膠炙　當歸　續斷
芎藭各三兩　銀隨多少
右六味切以水一斗先煑銀取七升去銀內餘藥煎取二升
半內膠令烊分三服不差更作千金同
又療姙娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方
艾葉　阿膠炙　芎藭　當歸各三兩
甘草一兩炙
右五味切以水八升煑取三升去滓內膠令烊分三服日
三千金文仲備急同
又療姙娠六七月胎不安常處旋復花湯方
旋復花一兩　厚朴炙　白朮　枳實炙
黃芩　茯苓各三兩　半夏十銖洗　芍藥
生薑各二兩
右九味切以水一斗煑取二升半先食分五服日三夜二忌羊

靜嘉堂文庫所藏

肉餳醋桃李雀肉等千金同出第十一卷中

删繁療女人懷姙胎動不安葱豉安胎湯方

香豉一升熬　葱白一升切　阿膠二兩炙

右三味切以水三升煑二物取一升去滓下阿膠更煎膠烊服一日一夕可服三四劑出第七卷中經心録同

文仲徐王効神驗胎動方

當歸六分　芎藭四分

右二味切以水四升酒三升半煑取三升分三服若胎死即出比用神驗血上心腹滿者如湯沃雪救急經心録同崔氏用米醋二升煎二十沸服

又安胎寄生湯療流下方

桑上寄生五分　白术五分　茯苓四分　甘草十分炙

右四味切以水五升煑取二升半分三服若人壯者可加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑四分即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等崔氏小品經心同出第七卷中

動胎腰腹痛方三首

廣濟療婦人姙娠動胎腰腹痛及血下方

當歸三兩　葱白一升切　芎藭三兩　艾葉二兩炙

鹿角膠二兩炙　苧根三兩

右六味切以銀汁一斗煑取三升絞取滓內膠上火膠烊分三服服別相去如人行六七里未好耄停一日更進一劑無所忌出第三卷中

小品苧根湯療勞損動胎腹痛去血胎動向下方

苧根　乾地黄各二兩　當歸　芍藥

阿膠炙　甘草炙各一兩

靜嘉堂文庫所藏

右六味切以水六升煑取二升去滓内膠烊分三服忌海藻
菘菜蕪荑出第七卷中

救急療姙娠動胎去血腰腹痛方

芎藭　阿膠炙　當歸　青竹茹各三兩

右四味切以水一斗半煑銀二斤取六升去銀内藥煎取二
升半分三服日再夜一不差更作一劑集驗千金文仲古
今録驗備急經心録同出第四卷中

頓仆胎動方四首

集驗療姙娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安傷損
腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方

當歸　芎藭　甘草炙　阿膠炙

芍藥各二兩　艾葉三兩　乾地黄四兩

右七味切以水五升好酒三升合煑取三升去滓内膠更上
火令膠烊分三服日三不差更作忌海藻菘菜蕪荑文仲
同出第十一卷中

文仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方

擣黄連下篩酒服方寸匕日三愈血乃止忌猪肉冷水
等物

又方

赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破内小豆中更
熬令黄黒末和酒服一匕日三服

又方

膠三兩炙　當歸二兩　甘草一兩炙

右三味切以水五升煑取二升分再服忌菘菜海藻並出第
七卷中

胎數傷及不長方三首

廣濟療婦人懷姙數傷胎方

靜嘉堂文庫所藏

鯉魚二斤　粳米一升

右二味如法作臛少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月中頓三過作効安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年同出第三卷中

集驗療婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者水漬沒內鹽如棗煑令熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當汗如鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安出第十一卷中

古今録驗療姙娠養胎白朮散方

白朮　芎藭各四分　蜀椒三分汗　牡蠣二分

右四味擣下篩酒服滿一錢匕日三夜一但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半夏大錢二十枚服之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴大麥粥服之病雖愈盡服之勿置裴伏張仲景方忌桃李雀肉等出第十一卷中

姙娠傷寒方四首

廣濟療姙娠傷寒頭痛壯熱支節煩疼方

前胡　知母各三兩　石膏五兩　大青

黃芩　梔子各一兩　葱白一升切

右七味切以水七升煑取二升三合絞去滓分三服服別相去如人行七八里再服不利忌熱麪羊肉集驗文仲備急救急同出第三卷中

千金療姙娠傷寒方

葱白十莖　生薑二兩切

右二味以水三升煑取二升半頓服取汗

又方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸匕取汗出並第二卷中

靜嘉堂文庫所藏

救急療婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變爲黑斑溺血氣方

升麻　梔子人各四兩　大青　杏人去皮尖

黃芩各三分　葱白切一升

右六味切以水六升煑取半分三服出第四卷中

姙娠患瘧方二首

集驗療姙娠患瘧湯方

常山二兩　甘草一兩炙　黃芩三兩　烏梅十四枚碎

石膏八兩

右五味切以水一升半合漬藥一宿煑三四沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服忌海藻菘菜生葱千金救急古今錄驗同

千金姙娠患瘧方

常山　竹葉各三兩　石膏八兩碎　糯米一百粒

右四味切以水六升煑取二升半去滓分三服第一服未發前一食久服之第二服取臨欲發餘一服用塗頭額及胷前五心藥滓置頭邊當一日勿進水及進飲食過發後乃進飲粥忌生葱菜集驗文仲備急同出第二卷中

姙娠下痢方四首

千金療姙娠下痢方

白楊皮一斤以水一大升煑取二小升分三服

又姙娠及產巳寒熱下痢方

黃連一升　梔子二十枚擘　黃蘗一斤

右三味切以水五升漬一宿煑三沸服一升一日一夜令盡嘔者加橘皮一把生薑二兩翼同並出第二卷中

文仲療姙娠下痢不止方

黃蘗　乾薑　赤石脂各二兩　石榴皮一具

靜嘉堂文庫所藏

右四味切以水八升煑取二升分三服出第七卷中

古今錄驗療姙娠下痢方

酸石榴皮　黄芩　人參各三兩　榉皮四兩

粳米三合

右五味切以水七升煑取二升半分三服千金經心錄同

出第三十四卷中

姙娠心痛方九首

千金療姙娠心痛方

青竹茹一升　羊脂八兩　白蜜三兩

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日三服

又方

蜜一升和井底泥泥心

又方

青竹皮一升酒二升煑三沸頓服之

又方

破雞子一枚和酒服之

又方

麻子三升水八升煑取五升分五服

又方

橘皮三兩　豉二兩

右二味擣為丸如梧桐子服二七丸

又方

燒牛屎焦末水服方寸匕日三並出第二卷中

文仲葛氏療姙娠卒胎上迫心痛方

取弩弦急帶之立愈出第七卷中

古今錄驗療姙娠卒得心痛欲死朮湯方

白朮六兩　黄芩三兩　芍藥四兩

右三味切以水六升煑取二升半分三服半日令盡微下水

令易生忌桃李雀肉出第三十四卷中

姙娠腹痛方三首

靜嘉堂文庫所藏

千金療妊娠腹中痛方
生地黃三斤擣絞取汁酒一升合煎減半頓服
又方
燒車釭脂末内酒中服又服一升蜜良並出第二卷中
古今錄驗療妊娠腹痛或是冷痛或是胎動葱白當歸湯方
葱白一虎口　當歸三兩
右二味切以水酒共五升煑取二升分再服亦將小便服相
去一炊頃出第三十四卷中
妊娠漏胞方五首
小品療妊娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞
有所去名曰傷胎視說要知如此小豆散療數傷胎將用之方
赤小豆五升濕地種之令生芽乾之
右一物下篩懷身數月日經水尚來以温酒服方寸匕日三得
效便停千金救急經心錄同出第七卷中
集驗妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方
雞子十四枚取黃以好酒二升煑使如餳一服之
又方
生地黃汁一升酒四合合煑三四沸頓服之不止頻
服救急千金文仲備急古今錄驗經心錄同並出第
十一卷中
崔氏療妊娠漏胞方
乾地黃四兩　乾薑二兩
右二味擣篩酒服方寸匕日再服集驗文仲經心錄同
又方
乾地黃擣末以三指撮酒服之不過三服甚良千金
同並出第十卷中

靜嘉堂文庫所藏

妊娠下血及尿血方五首

千金療妊娠卒下血方

葵子一斗

右一味以水五升煑取二升分三服差

又方

生艾葉一升

右一味以酒五升煑取二升分三服冬用莖

又方

生地黃一升切

右一味以酒四升煑取二升分三服亦療落身後血

又方

燒秤錘令赤內酒中沸定取出飲之

又方

葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三並出第二卷中

文仲療妊娠下血方

取黍膏燒末服一匕日三出第七卷中千金云黍莖

古今錄驗療妊娠下血豆醬散方

豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸匕日五六服出第三十四卷中

妊娠小便不通利方五首

千金療妊娠小便不通方

蕪菁子七合擣爲末水和方寸匕服日三出第二卷中

千金翼療妊娠小便不利方

葵子一升　榆白皮一把

右二味以水五升煑五沸服一升日三服千金同

又方

葵子　茯苓各一兩

靜嘉堂文庫所藏

一右三味爲散水服方寸匕日三小便利止千金同並出第五卷中

古今録驗療姙娠卒不得小便方

杏人二十枚去皮尖熬令變色

右一味擣服如大豆大七枚立得利

又療姙娠不得小便方

滑石水和泥臍二寸並出第三十四卷中

姙娠子淋方五首

小品療姙娠患子淋宜下地膚大黄湯

地膚草　大黄各三兩　知母　黄芩

茯苓一作猪苓　芍藥　枳實炙　升麻

通草　甘草炙各二兩

右十味切以水八升煑取三升分三服得下後淋不好差還飲

一地膚葵根汁忌海藻菘菜酢物

臣陸樹聲

又方

猪苓五兩

右一味擣篩以白湯三合和方寸匕爲一服漸至二匕日三

夜二盡不差宜轉下之服甘遂散出第七卷中甘遂散在後大小便不利中

千金療姙娠患子淋方

葵子一升以水三升煑取二升分再服經心録同

又方

葵根一把水三升煑取二升分再服出第二卷中

經心録療姙娠患子淋小便數出少或熱痛酸疼及足煩地膚

飲方

地膚草三兩以水四升煑取二升半分三服日三日一

劑文仲小品同出第六卷中

姙娠大小便不利方五首

靜嘉堂文庫所藏

小品療姙娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服
甘遂散下之方
太山赤皮甘遂（二兩）
右一味擣篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩得微
下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至
半錢匕以微下為度中間將猪苓散黃蘗寄生湯在療子淋
方中經心録同出第七卷中（子淋方中唯有猪苓散無黃蘗寄生湯）
古今録驗療姙娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎
除熱葵子湯方
葵子（二升） 滑石（四兩碎）
右二味以水五升煑取一升盡服須臾當下便愈出第二
十四卷中
姙娠子癇方二首
小品療姙娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦仍不醒者名為
痙病亦號子癇病亦號子冒葛根湯若有竹近可速辦者當先
作瀝汁辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯此二療會得其
一種其竹瀝偏療諸痙絶起死也非但偏療姙娠產婦絶死者有
効小兒忽癇痙金瘡療之亦驗作竹瀝法
取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片以
塼並側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出以器
承之取服
又主痙冒葛根湯療姙娠臨月因發風痙忽悶憒不識人吐逆
眩倒小醒復發名為子癇病方
貝母 葛根 牡丹（去心） 木防巳
防風 當歸 芎藭 桂肉（切熬）
茯苓 澤瀉 甘草（炙各二兩） 獨活

石膏（碎） 人參（各三兩）
右十四味切以水九升煑取三升分二服貝母令人易產若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢物並出第七卷中

姙娠水氣方三首

集驗療婦人姙娠手脚皆水腫攣急方
赤豆（五升） 商陸根（一斤切） 一方加澤漆（一斤）
右三味以水三斗煑取一斗常稍稍飮之盡更作千金同出第十一卷中

千金療姙娠腹大胎間有水氣生魚湯方
生鯉魚（二斤） 生薑（五兩） 白朮（三兩） 芍藥
當歸（各三兩） 茯苓（四兩）
右六味切以水一斗二升煑魚熟澄清取八升內藥取三升分三服忌桃李雀肉酢物等集驗同出第二卷中

崔氏療姙娠體腫有水氣心腹急滿湯方
茯苓 白朮（各四兩） 旋復花（二兩） 杏人（去皮尖）
黃芩（各三兩）
右五味切以水七升煑取二升半分二服服別溫飮之忌桃李雀肉酢物等千金救急古今錄驗集驗同出第十卷中

損娠方六首

廣濟療婦人因損娠下血不止方
當歸 白龍骨 乾地黃（各八分） 地楡
阿膠 芍藥 乾薑（各六分） 熟艾（四分）
牛角鰓（十分炙令黃） 蒲黃（五分）
右十味擣篩爲散空腹以飮服方寸匕日二服漸加至二匕差止不吐利忌生冷油膩猪魚蒜蕪荑出第三卷中

靜嘉堂文庫所藏

千金落娠胎墮下血不止方

丹參十二兩

右一味切以酒五升煑取三升分三服集驗文仲備急同出第二卷中

又方

地黃汁和代赭末服方寸匕

又方

桑蝎蟲屎燒酒服方寸匕並出第四卷中

救急療損娠方

取朱砂末一錢匕生雞子三顆打取白和朱砂頓服胎若死即出如未死即安出第五卷中

古今錄驗療婦人墮娠血不盡來去喜煩滿鹿角屑豉湯方

鹿角屑一兩熬　香豉一升半

右二味以水三升煑令三沸漉去滓然後內鹿角屑攪令調頓服須臾血下出第三十七卷中

數墮胎方四首

刪繁療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之源黃耆散方

黃耆　吳茱萸　乾薑　人參

甘草炙　芎藭　白朮　當歸

乾地黃各二兩

右九味擣散清酒服一匕半日再服加至兩匕爲劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等經心錄同出第七卷中

千金療姙娠數墮胎方

姙娠三月灸膝下一寸七壯

又方

赤小豆末酒服方寸匕日二亦主姙娠數月月水上

靜嘉堂文庫所藏

來者並出第三卷中
經心録紫石門冬丸主風冷在子宮有子常落或始爲婦便患
心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悅令人有子方
紫石英　天門冬去心　五味子三兩　禹餘粮
蜀椒汗　烏頭炮　卷柏　烏賊骨
寄生　石南　當歸各一兩　杜仲
澤瀉　遠志去心　蓯蓉　桂心
甘草炙　石斛　柏子人　辛夷
人參各二兩　雲母燒一兩
右二十二味末之以蜜丸酒服二十丸如梧桐子稍加至三十
四十丸日三忌海藻菘菜豬肉冷水生葱鯉魚千金同出第六卷中
姙娠得病欲去子方三首
小品療姙娠得病事須去胎方
又方
麥蘗一升末和煑二升服之即下神効
又方
七月七日法麴三升煑兩沸宿不食旦頓服即下並
出第二卷中
文仲療姙娠得病欲去胎方
取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出此與
阮河南療產難同出第七卷中附後千金經心録同
落胎去胎方四首
廣濟療落胎方
栝樓四兩　桂心五兩　牛膝三兩　瞿麥二兩
右四味切以水七升煎取二升三合去滓分三服服別如人行
八九里進之無忌
又方

靜嘉堂文庫所藏

取牛膝六七莖綿纏搥頭令碎深內至子宮頭忌生葱
猪牛肉並出第三卷中
小品療羸人欲去胎方
甘草炙　乾薑　人參　芎藭
生薑　桂心　蟹爪　黄芩各一兩
右八味切以水七升煑取二升分三服忌海藻菘菜生葱
出第七卷中
千金欲去胎方
大麴五升清酒一升煑三沸去滓令盡分五服當宿
勿食旦再服其子如糜令母肥盛無疾若千金不傳
出第三卷中
產乳序論三首
崔氏夫人生壽夭雖有定分中間枉橫豈能全免若調攝會理
或可致長生若將護乖方乃胎乳傷促且中人之性識異弘遠
言及產育情多鄙之都未知此道幽深博施處廣僕褰帷之
暇頗敦經史遠乎藥術彌復關懷今歷選群方兼申短思苟
非切要詎能載録脫述職孤戍空莊四絕尋醫訪道理闕多疑
豈得坐而相守以俟其斃此書所記故緣於此蓋擬備諸私室
未敢貽厥將來必有以為要亦所不隱也余因披閱欒公調氣
方中見欒公北平陽道慶者其一妹二女並皆產死有兒婦臨
月情用憂慮入山尋余請覔滑胎方余報言少來多遊山林未
經料理此事然當為思量或應可解慶停一宿余輙憶想畜生
之類緣何不聞有產死者婬女偷生賤婢獨產亦未聞有產死者
此當由無人逼佐得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚居
女婦輩當由兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其驚怖驚
怖畜結生理不和和氣一亂痛切唯甚傍人見其痛甚便謂至

靜嘉堂文庫所藏

時或有約髻者或有力腹者或有冷水潠面者努力強推見便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致運絶更非佗緣至且以此意語慶慶領受無所聞然猶苦見邀向家乃更與相隨停其家十餘日日晡時見報云見婦腹痛似是產候余便教屏除牀案遍一房地布草三四處懸繩繫木作衎度高下令得蹲當腋得憑當衎下敷慢氈恐見落草悞傷之如此布置訖令產者入位語之坐卧任意爲其說方法各有分理順之則全逆之則死安心氣勿怖強此產亦解人語語訖閉户户外安牀余共慶坐不令一人得入時時隔户問之何似荅言小痛可忍至一更令爛煑自死牝雞取汁作粳米粥粥熟急手攪使渾渾適寒溫勸令食三升許至五更將末便自產聞兒啼聲始聽人入產者自若安穩不異玄小小痛來便放體長吐氣痛即止蓋任分和氣之効也慶問何故須食雞肉汁粥荅云牝雞性滑而濡庶使氣滑故耳問何不與肉荅云氣將下恐肉不卒消爲妨問何故與粥荅云若飢則氣上氣下則速產理不欲令氣上故耳慶以此爲產術之妙所傳之處無不安也故知欒公隱思妙符神理然則日遊反支之類復何豫哉但以婦人怯弱臨產驚遽若不導以諸法多恐志氣不安所以撿諸家方法備題如左其間取捨各任量裁凡婦人有難必須先撿此書推所投月日知犯忌各須豫慎不得犯之其應次須帳幕皮醋藏衣等物之類並草經營入月即須使足若不豫備臨急周遮事必致闕唯舊經事者始達此言豫備不虞古之善教也

又凡產者雖是穢惡然將痛之時及未產已產皆不得令死喪汚穢家人來視之必產難若已產者則傷子

又凡產法唯須熟忍不得逼迫要須見痛欲出然後抱腰傍人不得驚擾浪作形勢但此事欒公法中已經商略無用師

靜嘉堂文庫所藏

巫妄述已能攅相牽挽失其本性今故重述特宜隨也

崔氏年立成圖法一首

女人年十三 行年在庚申反支在正月七月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在辰戌日開肚在辛八肚在甲

女人年十四 行年在巳求反支在八月二月禍害在西南坤絕命在西南兌生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產產婦著赤衣卧南首懸尸在卯酉日開肚在壬八壯在癸

女人年十五 行年在戊午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首懸尸在寅申日開肚在癸八壯在壬

女人年十六 行年在丁巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首懸尸在丑未日開肚在申八壯在辛

女人年十七 行年在丙辰反支在五月十一月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在子午日開肚在乙八壯在庚

女人年十八 行年在乙卯反支在六月十二月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧西北首懸尸在巳亥日開肚在丙八壯在丁

女人年十九 行年在甲寅反支在正月七月禍害在東南巽絕命在南方离生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首懸尸在辰戌日開肚在丁八壯在丙

女人年二十 行年在癸丑反支在二月八月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在卯酉日開肚在庚八壯在乙

女人年二十一 行年在壬子反支在三月九月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在寅申日開肚在辛八壯在甲

女人年二十二 行年在辛亥反支在四月十月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首懸尸在丑未日開肚在壬八壯在癸

女人年二十三 行年在庚戌反支在五月十一月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首懸尸在子午日開肚在癸八壯在壬

女人年二十四 行年在己酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣東方震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首懸尸在巳亥日開肚在甲八壯在辛

靜嘉堂文庫所藏

女人年二十五行年在戊申反支在正月七月禍害在東方震絶命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北黃衣師看產產婦著黃衣卧東北首懸尸在辰戌日開肚在乙八壯在庚

女人年二十六行年在丁未反支在二月八月禍害在北方坎絶命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首懸尸在卯酉日開肚在丙八壯在丁

女人年二十七行年在丙午反支在三月九月禍害在東南巽絶命在南方離生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首懸尸在寅申日開肚在丁八壯在丙

女人年二十八行年在乙巳反支在四月十月禍害在西方兌絶命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在丑未日開肚在庚八壯在乙

女人年二十九行年在甲辰反支在五月十一月禍害在南方離絶命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在子午日開肚在辛八壯在甲

女人年三十行年在癸卯反支在六月十二月禍害在西南坤絶命在西方兌生氣在南方離宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首懸尸在巳亥日開肚在壬八壯在癸

女人年三十一行年在壬寅反支在正月七月禍害在西北乾絶命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首懸尸在辰戌日開肚在癸八壯在壬

女人年三十二行年在辛丑反支在二月八月禍害在東北艮絶命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首懸尸在卯酉日開肚在甲八壯在辛

女人年三十三行年在庚子反支在三月九月禍害在東方震絶命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在寅申日開肚在乙八壯在庚

女人年三十四行年在乙亥反支在四月十月禍害在北方坎絶命在東方震生氣在西北乾宜喚西北白衣師看產產婦宜著白衣卧西北首懸尸在丑未日日肚開在丙八壯在丁

女人年三十五行年在戊戌反支在五月十一月禍害在東南巽絶命在南方離生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首懸尸在子午日開肚在丁八壯在丙

女人年三十六行年在丁酉反支在六月十二月禍害在西方兌絶命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在巳亥日開肚在庚八壯在乙

女人年三十七行年在丙申反支在正月七月禍害在南方離絶命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在辰戌日開肚在辛八壯在甲

靜嘉堂文庫所藏

女人年三十八行年在乙未反支在二月八月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產產
婦宜著赤衣卧南首懸尸在卯酉日開肚在壬八壯在癸
女人年三十九行年在甲午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產
婦宜著黑衣卧北首懸尸在寅申日開肚在癸八壯在壬
女人年四十行年在癸巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣右東方震宜喚東方青衣師看產產
婦宜著青衣臥東首懸尸在丑未日開肚在甲八壯在辛
女人年四十一行年在壬辰反支在五月十一月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產
產婦宜著青衣臥東首懸尸在子午日開肚在乙八壯在庚
女人年四十二行年在辛卯反支在六月十二月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北黃衣師看產
產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在巳亥日開肚在丙八壯在丁
女人年四十三行年在庚寅反支在正月七月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方白衣師看產
產婦宜著白衣卧西北首懸尸在辰戌日開肚在丁八壯在丙
女人年四十四行年在己丑反支在二月八月禍害在東南巽絕命在南方离生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產

婦宜著白衣卧西首懸尸在卯酉日開肚在庚八壯在乙
女人年四十五行年在戊子反支在三月九月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產
產婦宜著青衣卧東南首懸尸在寅申日開肚在辛八壯在甲
女人年四十六行年在丁亥反支在四月十月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產
產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在丑未日開肚在壬八壯在癸
女人年四十七行年在丙戌反支在五月十一月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產
產婦宜著赤衣卧南首懸尸在子午日開肚在癸八壯在壬
女人年四十八行年在乙酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產
產婦宜著青衣卧東首懸尸在巳亥日開肚在甲八壯在辛
女人年四十九行年在甲申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師
看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在辰戌日開肚在乙八壯在庚
凡禍害絕命上產婦不可向之大小便又不得向產犯者凶產
後血不止

靜嘉堂文庫所藏

凡生氣之上宜產婦向之坐令兒長壽母子俱吉
凡閉肚之上臨月及已產未滿月皆不得向其處大小便
及棄不淨水犯者令人閉塞難產失顏色腹痛面痿黃
令臍絞痛咽喉不利凶
凡八壯之地產婦廬帳門不得向之開又不得於其處產
令閉塞難產大凶
凡運鬼力士犯者令產婦運悶至欲產日宜解袋口即易
產吉
凡反支月不得使血露污地或令子死腹中或產不順皆須
先布灰草然後敷馬驢牛皮於其上產吉
凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉
凡行年本命相俱坐攀轡吉

十二月立成法一首 并圖

正月三月五月七月九月十一月福德在丙壬
二月四月六月八月十月十二月福德在甲庚
夫人臨產必須避諸凶神逐月空福德之地若神在外於舍
內產若在內於舍外產令於 福德及空地爲產帳其舍內
福德處亦依帳法

靜嘉堂文庫所藏


正月空在丙壬
北
西
東
南
申
庚
酉大耗
辛
戌月白虎
亥
壬地藏衣吉
子
癸
丑
寅雷公招搖
甲
卯軒轅大時
乙
辰
巳
丙
午
丁
未

二月空在甲庚
北
西
東
南
申
庚
酉狂虎
辛
戌大耗
亥雷公月白虎
壬
子軒轅大時
癸
丑咸池
寅
甲
卯招搖
乙
辰
巳
丙
午
丁
未

靜嘉堂文庫所藏

南
西
三月
在丙
東
北
申
庚
酉
辛
戌
亥大夫
壬安產婦
子
癸
丑
寅
甲
卯
乙
辰
招
巳
丙
午
丁
未

南
西
四月
在甲庚
東
北
申
庚
酉
辛
戌
亥天侯
壬
子大夫
癸
丑
寅
甲
卯
乙
辰
巳
丙
午
丁
未

靜嘉堂文庫所藏


五月空
在丙子
西
北
東
南
亥
壬
子
癸
丑大夫
乙
甲
巳
丙
午
丁
未
申
庚
酉
辛
戌
乾
艮
寅
卯
辰
子狂虎

六月空
在甲庚
西
北
東
南
亥雷公
壬
子
癸
丑咸池
寅大夫
卯白虎狂虎
乙
辰
巳
丙
午
丁
未
申
庚
酉
辛
戌
乾
艮
甲

靜嘉堂文庫所藏


七月空
在丙壬
北
東
亥雷公
壬藏衣吉一云安産婦帳
子軒轅大時一云狂虎
癸
丑豐隆吴時
艮運鬼力士
寅大夫一云天狗
甲
卯月白虎一云大夫
乙
辰一云月白虎

八月空
在甲庚
北
東
西
乾
亥天狗天候
壬
子
癸
丑豐隆吴時
寅
乙

九月空
在丙壬
北
東
壬地藏衣吉
子天狗
癸
丑
艮運鬼力士
寅雷公
甲
卯軒轅大時
乙


十月空
在甲庚
北
東
亥招搖雷公
壬
子軒轅大時
癸
丑咸池天狗
寅
甲地安產婦帳
卯狂虎
乙天德
辰

靜嘉堂文庫所藏





靜嘉堂文庫所藏

大時招揺咸池吳時雷公豐隆軒轅月白虎大夫狂虎天候天狗運鬼力士等十三神月別具注如圖産婦犯之大凶宜依月空處坐吉其見衣亦依天德月空之處藏之吉但臨産及未滿月皆不得在懸户閈肚之上小便亦不得棄浣衣不淨水慎之仍不得以雜物弊其上

推日遊法一首

靜嘉堂文庫所藏

日遊圖



常以癸巳日入內宮一十六日至己酉日出癸巳甲午乙未
丙申丁酉在紫微北宮
戊戌己亥庚子辛丑壬寅在南宮
癸卯一日在天廟西宮
甲辰乙巳丙午丁未戊申在御女東宮
右日遊在內產婦宜在外別於月空處安帳產吉
己酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅在外東北維
乙卯丙辰丁巳戊午己未在外東方
庚申辛酉壬戌癸亥甲子乙丑在外東南維
丙寅丁卯戊辰己巳庚午在外南方
辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子在外西南維
丁丑戊寅己卯庚辰辛巳在外西方
壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥在外西北維

靜嘉堂文庫所藏

戊子己丑庚寅辛夘壬辰在外北方

右日遊在外宜在内産吉凡日遊所在内外方不可向之産凶

體玄子爲産婦借地法一首

東借十步　西借十步　南借十步

北借十步　上借十步　下借十步

辟方之中揔借四十餘步此中産婦安居無所妨礙無所畏忌

諸神擁護百鬼速去急急如律令

右件法入所投月即寫一本貼著産婦所居正中北壁上

更不須避日遊反支及諸神等比頻用有驗故録耳

日曆法二首

甲子日在内面向東北面南二角吉　乙丑日在内面向西南西北東南三角吉

丙寅日在内面向西南西北二角吉　丁夘日在内面向西南西北二角吉

戊辰日在内面向西南西北二角吉　己巳日在内面向西北東北二角吉

庚午日在内面向西北東北二角吉　辛未日在内面向西北東南東北三角吉

壬申日在内面向東南東北二角吉　癸酉日在内面向西北東北東南三角吉

甲戌日在内面向東南西南二角吉　乙亥日在内面向東北西南二角吉

丙子日在内面向西南東北二角吉　丁丑日在内面向西南西北東南三角吉

戊寅日在外面向西北西南二角吉　己夘日在外面向東南西南西北三角吉

庚辰日在内面向東北西北二角吉　辛巳日在内面向西北西南東北三角吉

壬午日在内面向西南東北二角吉　癸未日在内面向東南東北二角吉

甲申日在内面向東南西北二角吉　乙酉日在内面向東南西北東北三角吉

丙戌日在内面向東北西南二角吉　丁亥日在内面向東北西南東南三角吉

戊子日在内面向西南東北二角吉　己丑日在内面向東南西南西北三角吉

庚寅日在内面向東南西北二角吉　辛夘日在内面向東南西北二角吉

壬辰日在内面向西南東北二角吉　癸巳日在外面向西南東北西北三角吉

甲午日在外面向西南西北二角吉　乙未日在外面向東南西北東北三角吉

靜嘉堂文庫所藏

丙申日在外面向西北東北二角吉　丁酉日在外面向西北東南東北三角吉
戊戌日在外面向東北西南二角吉　己亥日在外面向東北東南西南三角吉
庚子日在外面向東南東北二角吉　辛丑日在外面向東南西北西南三角吉
壬寅日在外面向東南西南二角吉　癸卯日在外面向東南西南西北三角吉
甲辰日在外面向西南西北二角吉　乙巳日在外面向西北西南東北三角吉
丙午日在外面向西南東北西北三角吉　丁未日在外面向西北東南東北三角吉
戊申日在外面向西北東北二角吉　己酉日在外面向東南西北東北三角吉
庚戌日在外面向東北東南二角吉　辛亥日在內面向東南西南二角吉
壬子日在內面向東南東北西南三角吉　癸丑日在內面向東南西南二角吉
甲寅日在內面向東南西北二角吉　乙卯日在內面向東南西南西北三角吉
丙辰日在內面向西南西北東北三角吉　丁巳日在內面向西南西北東北三角吉
戊午日在外面向西南西北東北三角吉　己未日在外面向西北東南東北三角吉
庚申日在內面向西北東南東北三角吉　辛酉日在內面向西北東南東北三角吉

壬戌日在內面向東南西北二角吉　癸亥日在內面向西南東北二角吉
凡日曆十二辰並有神殺禁忌不可向產日別須檢看
凡甲乙日生子勿著白衣宜著黑衣吉卧無西首勿庚辛日起　丙丁日生子勿著黑衣宜著青衣卧無北首勿壬癸日起
戊己日生子勿著青衣宜著赤衣卧無東首勿甲乙日起　庚辛日生子勿著赤衣宜著黃衣卧無南首勿丙丁日起
壬癸日生子勿著黃衣宜著白衣卧無四角首勿戊巳日起

安置産婦法二首

凡欲産時先以朱砂點産婦項後宛宛中又點鼻孔間柱兩傍宛宛中牛穿据處即向産處呪之曰此地空閑安居産婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫相觸忤三呪之訖即燒火於産處四方以幷華水四器亦置産處四方各横刀於水上其刀淨磨拭之

又法捉一刀子先向産處呪曰一尺刀子七寸刃拒以反支而治運如此三呪訖釘刀子著産處地上然後坐産已上並出第十上卷中

靜嘉堂文庫所藏

產難方二十四首

崔氏凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母面赤舌青口中沫出者母死兒活母脣口青口兩邊沫出者母子俱死文仲同出第十上卷中

廣濟療難產三日不出者方

取死鼠頭燒作屑井花水服千金崔氏救急同

又方

槐子十四枚蒲黃一合內酒中溫服須臾不生更服之千金集驗崔氏同

又方

吞生雞子黃三枚并少苦酒崔氏集驗備急文仲同

又方

吞皂莢子二枚亦効千金崔氏小品同並出第三卷中

小品療產難歷日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆二升　膠二兩

右二味以水九升煑豆令熟取汁內膠令烊一服五合不覺不過再即產崔氏千金同

又方

取馬銜一枚覺痛即令左手持之崔氏同

又方

取槐東引枝手把之崔氏同

又方

手捉鸕鷀頭甚驗崔氏同並出第七卷中

集驗若日月未至而欲產者方

末知母蜜和兎屎大服一丸痛不止更一丸千金崔氏小品同

又方

取夫衣帶五寸燒作灰酒服立下崔氏廣濟文仲同並出第七卷中

備急療難產方

取槐子吞三枚崔氏同

又方

取鑿柄入孔裏者燒末酒服之立下崔氏同

又方

弓弩弦三寸箭簳二寸各燒末酒服之崔氏同

靜嘉堂文庫所藏

又方
取羖羊角屑燒末酒服之千金崔氏同
又若母已死兒子不出方
但以水銀如彈丸格口内喉中捧起令下食頃又捧
令起子便落崔氏同
又方
擣蒲根絞取汁一二升灌口中此亦治母生子死驗
崔氏同
又療母子俱死者産難及胎不動轉者方
榆白皮三兩 葵子五合 甘草炙 桂心各一兩
右四味切以水四升煑取二升服一升須臾不産更服一升
忌海藻菘菜生葱崔氏小品同
又産難數日欲絶秘方
書奏作兩行字凡二十字文曰帝乙生子司命勿
止即出其胞及其子無病其母封其中央以朱印之令
産婦持之崔氏小品同
又産難六七日母困方
取好膠二兩清酒一升半微火烊膠内新雞卵一枚
鹽一寸匕相和頓服即産不産更服崔氏同
又産難母如死不知人事方
用陳葵子末三指撮酒服口噤者去齒下藥即愈
立驗崔氏同
又療婦人産難方
書紙曰坐爲蒲卧爲魚女屬母兒屬夫急急如律令
即産婦吞之又書兩道兩手各執一凡書三本崔氏
同並出第一卷中
救急療産難方
取厠前用草二七枚燒作屑服之千金崔氏同崔氏云日用箒

靜嘉堂文庫所藏

又方　取牛屎中大豆書一片作入字一片作出字還合吞之良崔氏同並出第四卷中

千金療難產方

令夫唾婦口中二七過立下集驗崔氏同出第十卷中

逆產方一十二首

小品療逆產方

鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上即愈崔氏千金集驗同

又方　鹽和粉塗兒兩足下即順矣千金崔氏同

又方　又彈丸二枚擣末三指撮溫酒服集驗千金崔氏同並出第七卷中

集驗療逆產方

燒錢令赤內酒中飲之崔氏同

又方　夫陰毛二七枚燒以豬膏和丸如大豆吞兒手即持丸出神驗千金崔氏同

又方　朱書左足下作千字右足下作黑字崔氏同

又方　生不出手足先見燒蛇脫皮末服刀圭亦云三指撮面向東酒服即順崔氏千金同

又方　眞丹刀圭塗兒腋下崔氏同

又方　以手中指取釜底黑煤交畫兒足下順出千金文仲崔氏備急同並出第十一卷中

刪繁療逆產難產數日不出者方

取桃人中破書一片作可字一片作出字還合吞之崔氏同

又療逆產方

取車肛中膏畫腋下及掌心崔氏文仲備急小品千

靜嘉堂文庫所藏

金集驗同
又療逆產胞衣不出方
取竈屋上黒塵酒服之千金崔氏同並出第七卷中
横產方四首
小品療横產及側或手足先出方
可持䴥鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自
當迴順文仲備急千金崔氏集驗同
集驗療横生方
取梁上塵三指撮酒服之千金文仲崔氏同出第十一
卷中
文仲療縱横不可出
用菟絲子末酒若米汁服方寸匕即出車前子亦好
服如上法千金崔氏同
又方
服水銀如大豆一枚備急崔氏同
右以前横產逆產二條條流雖別療法蓋同可以意量逐
善參用也
子死腹中欲令出方一十五首
集驗療子死腹中方
眞珠二兩酒服盡立出崔氏同
又方
取竈下黄土三指撮酒服之立出當著兒頭上千金
崔氏文仲同
又療胎死在腹方
取三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升
合煑令產婦面東向飲之立出千金備急崔氏同
又方
取瞿麥一斤以水八升煑取二升分再服不出更服
文仲千金崔氏同

靜嘉堂文庫所藏

又方
葵子一升 膠五兩 水五升煮取二升頓服出間日又
服崔氏千金文仲備急同並出第十一卷中
崔氏療子胎在腹中恐死不下方
當歸 芎藭各二兩
右二味以好釅醋二升煮藥二十沸頓服之若胎已死即下
如胎未死即便安穩也
又療子死腹中又娠兩兒一兒活一兒死令腹中死者出生者
安此方神驗萬不失一
蟹爪一升 甘草二尺炙切 阿膠三兩炙
右三味以東流水一斗先煮二味取三升去滓內膠令烊
頓服不能頓服分再服若人困拗口下藥入即活煎藥宜
東向竈以茅葦薪煮之集驗廣濟千金備急文仲同
又療姙身熱病子死腹中欲出之方
烏頭一枚
右一味細擣水三升煮取大二升稍稍摩臍下至陰下胎當
立出
又方 以苦酒濃煮大豆一服一升死兒立下不能頓服再
服之亦得千金同
又療子胎在腹內已死方
甘草一尺炙 蒲黃一合 筒桂四寸 香豉二升
雞子一枚
右五味切以水六升煮取一升頓服胎胞穢惡盡去大良千
金集驗同並出第十卷中
文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不產血
氣上湯心毋面無顏色氣欲絕方
猪膏一升煎 白蜜一升 淳酒二升

靜嘉堂文庫所藏

右三味合煎取二升分再服不能隨所能服之備急刪繁千金崔氏同

又子死腹中不出方

以牛屎塗母腹上立出備急崔氏千金同

又方

榆皮切一升 熟朱一兩

右二味以苦酒三升煑取一升頓服死兒立出集驗千金備急崔氏同並出第二卷中

救急療子死腹中方

服水銀三兩立出集驗千金備急文仲小品同

又方

取夫尿二升煑令沸飲之集驗千金崔氏同並出第四卷中

胞衣不出方二十首

廣濟療胞衣不出方

末竈突中土三指撮以水服之集驗千金備急文仲同

又方

取夫單衣蓋井上立出千金集驗救急崔氏小品同

又療胞衣不出方

取苦酒服赤朱一兩千金集驗崔氏同

又方

雞子一枚苦酒一合和飲之即出集驗千金崔氏同

又方

當户燒黍穰即出崔氏同並出第二卷中

小品療胞衣不出方

取皂莢擣末著鼻孔中嚏即出崔氏同

又方

鹿角末三指撮酒服之崔氏同

又方

鼉兒衣不出吞此符吉

延年療婦人傷娠及胎死腹中胞衣不出產後疾病及諸困竭欲死方

刺取羊血及熱飲之不能者人含吐與之能多益善若

靜嘉堂文庫所藏

不能咽取少鹽叉水漠其面此方神驗崔氏文仲備急同

叉胞衣不出方

以洗兒水服半梃即出崔氏同

叉療胞衣不出腹中滿則殺人方

但多服猪膏叉大豆一升苦酒一斗煑取三升分三服崔氏同

叉方

呑雞子黃兩三枚解髮刺喉中令得嘔即出若困極死者以水一升煑栝樓一枚三兩沸寫口中汁下即出出第十四卷中（崔氏云水一升煑螻蛄一枚三沸服）

救急療胞衣不出并兒橫到死膜中毋氣欲絶方

半夏（二兩洗）　白斂（二兩）

右二味擣篩服方寸匕小難一服橫生二服到生三服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩廣濟集驗小品千金備急文仲崔氏同

叉方　小豆小麥相和濃煑汁飲之立出小品千金備急崔氏同

叉療胞衣不出方

取灶箪當戶前燒之廣濟集驗千金崔氏同出第四卷中

必効療胞衣不出令胞爛牛膝湯方

牛膝（四兩）　滑石（八兩）　當歸（三兩）　通草（六兩）

葵子（一升）　瞿麥（四兩）

右六味切以水九升煑取三升分三服忌牛狗肉廣濟集驗千金崔氏同（通草一方作葬草）

叉方　服蒲黃如棗大良集驗千金崔氏同

叉方　生男呑小豆七枚生女呑二七枚千金崔氏並同

叉方　生地黃汁一升苦酒三合煖服之不能頓服再服之集

靜嘉堂文庫所藏

驗千金崔氏同

又方

澤蘭葉三兩　滑石五兩屑　生麻油二合

右三味以水一升半煑澤蘭取七合去滓內滑石生麻油頓服之廣濟集驗千金崔氏同並出第四卷中

[illegible]　[illegible]　[illegible] 巳上三符生產難產時吞之吉

[illegible] 產難燒此符水和服之吉　[illegible] 逆產橫產吞此符

右出崔氏產書

外臺秘要方卷第三十三

右迪功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張　寔　校勘

靜嘉堂文庫所藏

外臺祕要方卷第三十四 婦人下四十八門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

產婦忌慎法六首
令易產方六首
下乳汁方一十五首
妬乳瘡痛方一十四首
乳癰腫方一十八首
產後血暈心悶方一十首
產乳運絕方五首
產後血不盡腰脚疼惡露不下方七首
產後惡露不絕方四首
產後血氣煩悶方四首
產後心痛方三首

靜嘉堂文庫所藏

產後腹中絞刺痛方九首
產後虛熱方二首
產後虛勞方四首
產後風虛瘦損方四首
產後虛羸方三首
產後中風方三首
產後下痢方四首
產後赤白痢方五首
產後冷熱痢方二首
產後痢日數十行方二首
產後卒患淋方五首
產後小便不禁兼數方四首
產後小便數兼渴方二首
產後渴方二首
許仁則產後方一十六首
產後遺糞方三首
產後陰道開方二首
產後陰下脫方六首
八瘕方一十二首
肉癖方二首
崩中方一十一首
崩中去血方一十三首
帶下方一十首
婦人虛羸及月病不能食方三首
陰蝕及疳方八首
陰中腫痛方四首

靜嘉堂文庫所藏

陰中瘡方五首
陰痒方五首
陰痒有蟲方六首
陰下脫方四首
陰挺出方三首
女人傷丈夫頭痛方二首
交接輒血出痛方二首
童女交接他物傷方三首
小户嫁痛方四首
坐藥方三首
婦人欲斷產方四首
產婦忌慎法六首

千金論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令死喪汚穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

又凡婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著地則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

又凡產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母子俱病庶事皆不稱心能依圖無犯觸母子即得無疾子即易養

又凡欲產時特忌多人瞻視唯得三二人在傍待總產訖即告語衆人也若人衆令人難產

又凡產婦第一不得怱怱忙怕傍人極須少靜皆不得預緩顏急憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒生訖一切人及母皆忌問是男是女兒胎落地即急取口中惡物與新汲井水五合咽忌與煖湯物也勿令母看視穢汚耳

又產婦慎熱食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌也並出第二卷中

靜嘉堂文庫所藏

令易產方六首

千金令易產方

凡欲臨產時先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令至蜜即易生神驗

又方

生地黃汁半升生薑汁半合煎熟頓服

又方

燒藥杵令赤內酒中飲之小品同並出第二卷中

小品預服散令易生母無疾病未生一月日前預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺甘草散方

甘草八分炙 黃芩 大豆卷 粳米

麻子人 乾薑 桂心各二分 吳茱萸二分

右八味擣散酒服方寸匕日三忌海藻菘菜生葱千金同

又療婦人易生產飛生丸方

飛生一枚 槐子 故弩箭羽各十四枚

右三味擣末蜜丸桐子大覺便以酒服二丸即易產

又方

取蛇脫皮著衣帶中鑑鼻繫衣帶臨欲產時左手持馬銜右手持飛生毛令易產並出第七卷中

下乳汁方一十五首

廣濟療婦人乳無汁方

以母猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱白豉如常法著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少許汗佳乳未下更三兩劑甚驗崔氏同出第三卷中

靜嘉堂文庫所藏

千金療乳無汁漏蘆湯方
漏蘆 通草各八分 鍾乳四分 黍米一升
右四味切將米宿漬研取汁三升煑藥三四沸去滓作飲服經心録同
又方
土瓜根末酒服半錢匕乳日下如流水崔氏同
又療乳無汁單行石膏湯方
石膏四兩研以水二升煑三沸稍稍服一日盡良
又療乳無汁單行鬼箭湯方
鬼箭五兩水六升煑取四升去滓一服八合日三服亦可燒灰作末水服方寸匕日三
又下乳汁通草散方
通草 鍾乳研
右二味等分爲散麪粥服方寸匕日三百日後可兼養兩兒
又麥門冬散方
麥門冬去心 鍾乳研 通草 理石各等分研
右四味擣散食前後酒服方寸匕日三
又下乳汁漏蘆散方
漏蘆二分 鍾乳五分研 栝樓五分 蠐螬三分熬
右四味擣散食後粆糖水下方寸匕日三
又方
母猪蹄一具麤切以水二斗煑令熟餘五六升汁飲之甚良崔氏同
又方
猪蹄二枚炙擣碎 通草八兩切
右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作崔氏同

靜嘉堂文庫所藏

又方

栝樓根切一升酒四升煑三沸去滓服半升日三良

崔氏同

又方

栝樓青色大者一枚熟擣以白酒一升煑取四升去滓温飲一升日三若無大者用小者兩枚無青色者黃色者亦好崔氏同

又方

燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方

燒死鼠酒服灰方寸匕日三立下並出第二卷中

崔氏療乳汁不下方

鼠肉五兩　羊肉六兩　麞肉八兩

右三物合作臛噉之勿令食者知出第十卷中

妬乳瘡痛方一十四首

集驗論療婦人妬乳乳癰諸產生後宜勤濟乳不宜令汁畜積不去便不湏復出惡汁於內熱温壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也方

始妬乳急灸兩手魚際各二七壯斷癰脉也不復惡手近乳汁亦自出便可令小兒手助抑之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯自下外以小豆薄塗之癰處當差千金同

又產後不自飲兒及失兒無兒飲乳乳畜喜結癰不飲兒令乳上腫者方

以雞子白和小豆散塗之乳房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大者子含水使漱口中冷爲嗍取乳汁吐去之不含水漱熱去喜令乳頭作瘡乳孔塞也千金同

靜嘉堂文庫所藏

又療妬乳乳癰連翹湯方

連翹　升麻　杏人（去皮尖）　射干

防已　黄芩　大黄　芒消

柴胡（各三兩）　芍藥　甘草（炙各四兩）

右十一味切以水九升煑取三升分服忌海藻菘菜千金同

又方

取葵莖焼灰擣散服方寸匕日三即愈千金同

又療妬乳生瘡方

蜂房猪甲中土車轍中土各等分末苦酒和塗之良

千金同（一方又有車轂上脂一味）

又療婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黄汁出侵淫爲長百種療不差者動經年月名爲妬乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世論苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傅以黄芩漏蘆散及黄連胡粉散並佳方如左赤龍皮湯方

槲皮切三升以水一斗煑取五升夏冷用之秋冬温之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傅膏散千金同

又天麻草湯方

天麻草切五升以水一斗半煎取一斗隨寒温分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠尾花亦以洗侵淫黄爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散千金同

又飛烏膏散方

用焼朱砂作水銀上黒煙（名細粉者三兩熬令焦燥）　礬石（三兩燒粉）

右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三作散者不須和有汁自著可用散亦傅諸熱瘡黄爛侵淫汁瘡蜜瘡文

靜嘉堂文庫所藏

夫陰蝕瘑瘍諸小兒頭瘡疳蝕口邊肥瘡蝸瘡等並以此傅之
千金同
又黃連胡粉膏散方
黃連二兩　胡粉十分　水銀一兩同研令消散
右三味擣黃連爲末三物相和合皮裹熟挼之自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸濕痒黃爛肥瘡若著甲煎爲膏千金同
備急小品妬乳方
黃芩　白斂　芍藥各等分
右三味下篩漿水服一錢五匕日三若右乳結將去左乳汁若左乳結即將去右乳汁服即消千金同
又方
柳白皮酒煑令熱以熨上即消
又方
苦酒磨升麻若青木香或紫檀香以摩上並良一味即得佳
又方
已入腹者麝香薰陸香青木香雞舌香各一兩以水四升煑取二升分再服忌蒜麪酒牛馬猪肉
必効療婦人妬乳癰瘡遲愈五物雄黃䕡茹膏方
雄黃　白斂　雌黃　䕡茹各一分並切
亂髮如雞子一枚
右以猪脂半斤合煎三沸去滓乃內亂髮髮盡藥成以塗瘡不過十日差
乳癰腫方一十八首
廣濟療乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍方
大黃　芍藥　楝實　馬蹄炙令黃各等分

靜嘉堂文庫所藏

右四味擣散酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫處散不痛經宿乃消百無失一明晨更服一匕忌衝風熱食

深師療乳癰腫消核芍藥散方

芍藥　通草　桂心　昆布

白斂　附子炮　黃耆　人參

海藻　木占斯各一兩

右十味擣散以清酒服一錢匕日三當先食并療頸下氣結瘰癧

又乳癰衆醫不能療柏皮膏方

猪膏年多者佳柏皮三斤去黑皮以猪膏煎之當稍稍煎柏皮熟黑便漉出更煎餘柏皮如初盡以塗瘡取夢柏勿取餘者膏令淹沒柏皮而已甚驗

集驗療乳癰方

大黃二兩　莽草二分　伏龍肝十二分　乾薑二分

右四味擣末以酢和塗乳上痛即止一方生薑極驗可用也千金同

又方

取鹿角下篩散以猪頷下清汁服方寸匕不過再服亦以醋漿服之良千金云猪[illegible]鏑上清汁

又療乳癰四物膠薄貼方

膠炙　大黃　莽草　細辛

右各等分擣末以雞子白和塗紙上貼腫頻易晝夜貼之割紙穿如錢大出腫頭

又療乳癰三物桂心貼方

桂心三分　烏頭二分　甘草二分

右擣散以苦酒和塗腫上以小紙覆濡其上將乳居其中以乾布置乳下須臾布當濡有膿水也佳范汪同

靜嘉堂文庫所藏

千金翼排膿散主乳癰方

鐵粉　茯苓　桂心　細辛

芎藭　人參　防風　乾薑

黃芩　芍藥各四分　當歸　甘草炙各五分

右十二味擣散酒服方寸匕日三夜一加至一匕半服藥十日血出多勿怪是惡物除甚良出第五卷中

備急葛氏療婦人乳癰妬腫者或以經二三日衆療不差方

堅硬紫色削柳根皮擣熟熬令溫帛囊盛熨乳上冷更易甚良一宿即愈千金同

又方

研米搥二枚煑令熱以絮及巾覆乳上用二搥更互熨腫數十過差止已用大驗千金云炙熱

又乳癰方

大黃　竈下黃土各一分末　生薑二分

右三味擣末醋和塗乳痛即止極驗劉涓子不用生薑用生魚三味等分余比用鯽魚妙

又療乳癰方

大黃　鼠屎　黃連各一分

右三味擣末合鼠屎更擣以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米並可用千金同

救急療乳癰腫痛如升椀大痛不可忍方

取白薑石擣末一二升用雞子白和如稀泥傅腫乾更易之此方頻試驗如雞子處罪取榆白皮和擣傅即差

又療乳癰堅硬痛不可忍方

莨菪子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水一

靜嘉堂文庫所藏

大盞和頓服痛即止

又療乳癰腫方

以驗醋研地黃塗上乾即易不過三五遍服以酒研之

必効療婦人乳癰方

覺痛色未變時以飼猪米研汁飲之即差仍取猪槽

木厚如匙面火炙數數熨上

又療婦人乳癰丹參膏方

丹參 白芷 芍藥各二兩

右三味㕮咀以苦酒淹經宿又取猪脂半斤微火上煎之白

芷黃膏成去滓以膏塗上甚良

又療瘡上須貼膏方

黃耆八分 白芷 大黃各五分 當歸

續斷各四分 薤白二合切 松脂十二分 薰陸香

臘各十分、 猪脂一升 生地黃汁七合

右十一味切內地黃汁中漬半日內猪脂中微火上煎三上三下

白芷色黃膏成布絞去滓翦帛如瘡大小塗帛貼瘡上日

四五度易之終身無苦極効

產後血暈心悶方一十首

廣濟療產後血暈心悶不識人或神言鬼語氣欲絕方

荷葉二枚炙 蒲黃一兩 甘草二兩炙 白蜜一匙

地黃汁半升

右五味切以水三升煑取一升絞去滓下蒲黃蜜地黃汁

煖服立差止

又療產後心悶血氣衝上血暈羚羊角散方

取羚羊角一枚燒成灰末以東流水服方寸匕若

未差更服差

静嘉堂文庫所藏

救急產暈心悶大困方

鯽魚剥皮作鱠以虀食三兩口止

文仲暈絶方

蘇方木三兩碎以水五升煎取二升分再服或無

蘇木煑緋色衣取汁服甚驗

又方

取牆上青衣一抄以水四小升煑取二升分服又生薑汁一小升地黃汁一小升酒一大升相和煎三五六沸分再服每劑和大黃末一匙此方甚良

崔氏凡暈者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分免者第一須先取釅醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞其氣兼細細飲之此爲上法如覺暈即以醋噴面蘇來即飲醋仍少與解之（一云仍少與水解之）

又凡產後忽悶冒汗出不識人者是暴虛故也方

取破雞子吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者

又若久不識人或時復發者此爲有風因產血氣暴虛風行脉中故也若產後去血多者尤增此疾與雞子不醒者可急與竹瀝汁一服五合須臾不定復與五合頻得三五服立差並出第十上卷中

近効療血暈絶不識人煩悶方

紅藍花三兩新者佳以無灰清酒半升童子小便半大升煑取一大盞去滓候稍冷服之新汲水一大升煑之久良

又方

赤父馬糞絞取汁一大盞濕者良若乾者取新汲水半大盞和研絞取汁頓服亦主人血不止神驗夏侯拯錄

產乳暈絶方五首

崔氏療產乳暈絶方

靜嘉堂文庫所藏

以惡血服少許良

又方

以服洗兒水三合良

又方

覺暈即用三股麻繩長五六尺繫產婦右脚膝上令人捉兩頭急挽得醒徐徐解之並出第十上卷中

文仲療產乳暈絕方

半夏一兩洗擣篩丸如大豆内鼻中即愈崔氏同

救急療產乳暈絕方

生赤小豆擣爲散取東流水和方寸匕服之不差再服崔氏同

產後餘血不盡腰脚疼及惡露不下方七首

廣濟療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚疼不下食生地黃湯方

生地黃汁一升 芎藭 甘草各二兩炙 丹參四兩

蜜一合 生薑汁半合

右六味切以水三升煮取一升去滓内地黃汁蜜薑汁微火煎一兩沸一服三合日二夜三利一兩行中間進食與藥更進服

又療產後惡露不多下方

牛膝 大黃各八分 牡丹皮 當歸各六分

芍藥 蒲黃 桂心各四分

右七味擣散以生地黃酒服方寸匕日二血下止

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胷急氣滿兩脅痛方

生薑一斤 淡竹葉一升並切

右二味以水二升煮取一升去滓分再服

又療產後血不盡血痛悶方

取荷葉燒作灰煖水和服煮取汁亦良

靜嘉堂文庫所藏

又惡露不盡腹脹痛方
取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒末酒服
又方
取百斤秤錘一枚燒赤投酒五升中用此秤錘酒煑
當歸三兩取二升去滓分再服千金同
又療一切宿血及損傷瘀血在腹內不問新久并婦人月經不
通產後惡血不下皆良方
大黃 芒消各三兩 桃人四十枚去尖皮
右三味芒消桃人合擣四五百杵以酢漿二升半漬一宿空
腹攪調頓服之不能頓服者分作兩服良久先下糞次下
如豆泥汁或黑血爲驗強人日別服一劑弱人兩日服之下血
盡便止不過三兩劑忌生冷茶葵並出第四卷中
產後惡露不絕方四首
廣濟療婦人產後血露不絕崩血不可禁止腹中絞痛氣息急
療蓐病三十六疾方
亂髮燒灰研 阿膠各二兩炙 代赭 乾薑各三兩
馬蹄一枚燒 乾地黃四兩 牛角鰓五兩炙
右七味擣篩蜜和爲丸如梧桐子空腹以飲下二十五九日
二至四十九良
深師療產後虛冷下血及水穀下痢晝夜無數兼療惡露
不絕龍骨丸方
乾薑 甘草炙 桂心各二兩 龍骨四兩
右四味擣篩蜜丸如梧桐子以酒下二十丸日三忌如常法
此方甚良
文仲葛氏療血露不絕方
以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差
又隱居効方澤蘭湯療產後惡露不盡腹痛往來兼滿少氣

靜嘉堂文庫所藏

澤蘭熬八分　當歸三分　生地黃三分　芍藥十分

甘草炙六分　生薑十分　大棗十四枚擘

右七味切以水九升煑取三升分爲三服欲死塗身得差

産後血氣煩悶方四首

廣濟療産後心胷中煩悶血氣澀肋下妨不能食方

生地黃汁一升　當歸末一兩　生薑汁三合　酒五合

右五味和煎三四沸去滓分服一日令盡間食服

又血氣煩悶方

童子小便二升

取生藕擣絞取汁飲一升未定更飲差止竹瀝亦得千金同

集驗療産後血氣煩悶方

取生地黃汁一升酒三合相和微温頓服之千金同

千金療婦人産後氣欲絶心中煩悶不解必効方

竹葉切　麥門冬去心　小麥各一升　甘草一兩炙

生薑二兩　大棗十四枚

右六味切以水一斗煑竹葉小麥取八升去滓内餘藥煑取三升去滓分服心虛悸加人參二兩少氣力加粳米五合一方用竹皮若胷中氣逆加半夏二兩忌如常法出第三卷中

産後心痛方三首

集驗大巖蜜湯療産後心痛方

乾地黃　當歸　獨活　甘草炙

芍藥　桂心　小草　細辛各一兩

吴茱萸一升　乾薑三兩

右十味切以水九升煑取三升分三服良千金同

經心録蜀椒湯療産後心痛此大寒冷所爲方

靜嘉堂文庫所藏

蜀椒（二合汗） 芍藥（三兩） 半夏（洗） 當歸
桂心 人參 甘草（炙各二兩） 生薑汁（五合）
蜜（一升） 茯苓（二兩）
右十味切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合漸至六合盡勿冷飡千金同

千金羊肉湯療産後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣力方
羊肉（三斤） 當歸 黄芩 甘草（炙）
芎藭 防風（各二兩） 芍藥（三兩） 生薑（四分）
右八味切以水一斗二升煮羊肉減半煮藥取三升分温三服忌如常法崔氏同出第三卷中

産後腹中絞刺痛方九首

廣濟療産後腹中絞刺痛不可忍方
當歸 芍藥 乾薑 芎藭（各六分）
右四味擣散以酒服方寸匕日二服

又療産後内虚寒入腹腹中絞痛下赤煩毒譫語見鬼羊肉湯方
肥羊肉（一斤） 當歸 甘草（炙） 芍藥（各一分）
右四味切以水一斗煮羊肉取七升煮藥取二升分服

又療新産後腹中如弦常堅絞痛無聊方
蜜（一升） 當歸（一兩）
右二味末入蜜中煎融融耳適寒温頓服

千金當歸湯療婦人寒疝虚勞不足若産後腹中絞痛方
當歸（三兩） 生薑（五兩） 芍藥（二兩） 羊肉（一斤）
右四味切以水八升煮取三升適寒温頓服七合日三

又療産後疾痛桃人芍藥湯方
桃人（半升去皮尖熬） 芍藥 芎藭 當歸

靜嘉堂文庫所藏

乾漆熬　桂心　甘草炙各二兩
右七味切以水八升煮取二升半分三服
又單行茱萸酒療產後腹內外疾痛方
吳茱萸一升酒三升漬一宿煎取半升頓服亦可再
服差止並出第三卷中
必効療產後腹痛方
羌活四兩切酒二升煮取一升分服
又方
兔頭炙令熱以熨產婦腹如刀絞痛者熨之立定
又療痛不可忍方
取一苦瓠蘆未經開者亦覺痛即開去子訖以沸
釅酢投中蒸熱隨痛熨冷即換極甚効

產後虛熱方二首
千金蜀漆湯療產後虛熱往來心胷中煩悶滿骨節疼及頭
痛壯熱晡時輒甚又似微瘧方
蝭母知母也　芍藥各二兩　蜀漆葉　甘草炙
桂心　黃芩各一兩　生地黃一斤　黃耆五兩
右八味切以水一斗先煮地黃取七升去滓下諸藥煮取二
升半分三服湯療寒熱不損人忌如常法出第三卷中
千金翼療產後虛熱頭痛方
白芍藥　乾地黃　牡蠣各五兩熬　桂心三兩
右四味切以水五升煮取二升半分三服日三湯不損人無毒
亦療腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩甚驗大熱即除
出第六卷中
產後虛勞方四首
千金增損澤蘭丸療產後百病理血氣補虛勞方
澤蘭熬　甘草炙　當歸　芎藭各七分

靜嘉堂文庫所藏

附子炮　乾薑　白朮　白芷
桂心　細辛各四分　防風　人參
牛膝各五分　柏子人　乾地黃　石斛各六分
厚朴炙　藁本　蕪荑各三分　麥門冬八分去心
右二十味擣末蜜丸以酒下十五丸至二十丸良忌如常法
出第四卷中
延年增損澤蘭丸主產後風虛勞損黃瘦方
澤蘭七分熬　防風　乾地黃　當歸
細辛　桂心　茯苓　芍藥
人參　甘草炙　藁本　烏頭炮
麥門冬去心　石斛　紫菀　芎藭各五分
乾薑　柏子人　蕪荑人　厚朴炙
蜀椒汗各四分　白朮　黃耆各六分　紫石英研

石膏研各八分
右二十五味擣篩蜜和丸如梧桐子以酒下二十至三十丸
忌如常法
刪繁療產婦勞虛或本來虛寒或產後血脉虛竭四肢羸弱飲
食減少血脉斷絕血脉不通虛實依源澤蘭補虛丸方
澤蘭葉九分熬　石膏八分研　芎藭　甘草炙
當歸各七分　白芷　防風　白朮
藁本　蜀椒汗　厚朴炙　乾薑
桂心　細辛各五分
右十四味擣篩蜜丸如梧桐子酒下二十丸至三十丸日再忌
海藻菘菜桃李雀肉生葱等
古今錄驗澤蘭丸療產後風虛勞羸百病必効方
澤蘭葉六分　白芷　椒汗　蕪荑人

靜嘉堂文庫所藏

藁本　細辛各四分　白朮　柏子人
人參　桂心　防風　厚朴炙
丹參各五分　芎藭　甘草炙　當歸各七分
乾地黃十分

右十七味擣篩蜜和丸如梧桐子服二十丸至三十丸日再服忌
如常法

產後風虛瘦損方四首

廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方

澤蘭七分熬　厚朴炙　人參　石斛
蕪荑人　續斷　防風　桂心各三兩
芎藭　白朮　柏子人　五味子
黃耆　遠志皮各四分　赤石脂六分　乾地黃六分
甘草六分炙

右十七味擣末蜜丸如桐子以酒下二十丸至三十丸日再忌
如常法

小品療產後中風虛人可服他藥者一物若獨活湯主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煑之方

獨活三兩以水三升煑取一升分服柰酒者亦可酒水等煑之用白鮮皮亦依此法

千金云凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也又產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯痛甚切者不在此例後兩三日消息可服澤蘭丸比至滿月丸藥盡爲佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸又凡在蓐必須服澤蘭丸補服法必七日外不得早服也婦人因產取凉太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於老

靜嘉堂文庫所藏

百方療不能差桃人煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至
秋冬須服一兩劑以至年終常將服之
又桃人煎療萬病婦人產後百病諸氣方
桃人一千二百枚去雙人尖皮熬令香
右一味擣務令極細熟以上上酒一斗五升研三四遍如作
麥粥法以極細爲佳內小長項瓷瓶中令滿以麪遍封之
務取密內湯中煑一復時不停火使瓶口常出湯勿令
没藥成溫酒和服一匙日再丈夫服亦極妙
延年澤蘭丸主產後風虛損瘦不能食令肥悅方
澤蘭七分熬 當歸七分 甘草七分炙 藁本三分
厚朴三分炙 食茱萸三分 蕪荑三分 白芷三分
乾薑三分 芍藥三分 石膏八分緻煒者研 人參四分
柏子人四分 桂心四分 白朮五分

右十五味擣篩蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸日二加至
二十五丸忌生冷酢滑猪牛肉熱麪生葱桃李雀肉海藻
菘菜等
產後虛羸方三首
廣濟療產後虛羸喘乏或乍寒乍熱狀如瘧名爲蓐勞損猪腎湯方
猪腎一具去脂四破 香豉一升綿裹 白粳米一升 葱白切一升
人參 當歸各二兩
右六味切以水一斗煑取三升去滓分服七合以意消息忌
犬肉熱麪蒜出第三卷中 崔氏云以水三斗煑取五升適寒溫隨便飲之
救急療產後羸瘦不復令肥白方
烏豆肥大者淨拭熬熟如造豆黃法去皮擣爲屑下
篩以臘月猪脂成鍊者和丸如桐子以酒下五十丸日
再服一月內肥白也無所禁

靜嘉堂文庫所藏

古今録驗療產後諸病羸瘦欲令肥白飲食和調地黃羊脂煎方

生地黃汁一升　生薑汁五升　羊脂二斤　白蜜五升

右四味先煎地黃汁令餘五升下羊脂煎減半次下薑次下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒一升取煎如雞子大投酒中飲日三良

產後中風方三首

深師療產後中風口噤不知人小獨活湯方

獨活八兩　葛根六兩　生薑五兩　甘草二兩炙

右四味切以水九升煑取三升分三服微汗佳忌海藻菘菜

出第六卷中

小品大豆紫湯主婦人產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風冷濕所為方

大豆三升炒令炮斷預取器盛清酒五升沃熱豆中訖漉去豆得餘汁盡服之溫覆取微汗出身體纔潤則愈一以去風二則消血結云周德成姙胎觸覽困傷折胎死在腹中三日困篤服此酒即差後療無不佳

千金用大豆五升酒八升右云更合獨活湯所以爾者產後多虛著風以獨活消風去血故也重者十劑崔氏云如中風口噤加雞屎白二升和豆熬更佳

又療產後中寒風痓通身冷直口噤不知人方

白朮四兩酒三升煑取一升去滓頓服忌桃李雀肉等

產後下痢方四首

廣濟療產後腹痛氣脹脇下妨滿不能食兼之微痢方

茯苓　人參　厚朴炙各八分　甘草炙

橘皮　當歸　黃芩各六分

右七味擣散以飲下方寸匕日三度漸加至一匕半

又療產後下痢赤石脂丸方

赤石脂三兩　甘草炙　當歸　白朮

靜嘉堂文庫所藏

黃連一　乾薑一　秦皮各二兩　蜀椒汗
附子炮各一兩
右九味擣篩蜜和爲丸如桐子酒服二十丸日三忌猪肉冷水海
藻菘菜
深師療產後下痢膠臘湯方
粳米一合　臘如雞子一枚　阿膠　當歸各六分　黃連十分
右五味切以水六升半先煑米令蟹目沸去米内藥煑取二
升入阿膠臘消烊温分三兩服
千金療產後下痢腹痛當歸湯方
當歸　龍骨各三兩　乾薑一兩　白朮二兩
甘草炙一兩　附子炮一兩　熟艾一兩　芎藭二兩半
右八味切以水六升煑取二升半去滓分爲三服日三一日令
盡忌猪肉冷水桃李雀肉等出第三卷中

產後赤白痢方五首

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛方
當歸　芍藥　地榆　龍骨
黃連各八分　艾葉八分　甘草炙八分　厚朴炙八分
黃芩　乾薑各六分
右十味切以水八升煑取二升半去滓分温三服即差止忌生
冷油膩海藻菘菜猪魚肉
又療產後赤白痢臍下氣痛方
當歸八分　厚朴炙　黃連各十二分　豆蔻五枚去皮
甘草六分炙
右五味切以水五升煑取二升去滓分温三服差止忌如常法
文仲効方療產後赤白下痢腹中絞痛不可忍者
黃連四兩　黃蘗三兩　阿膠炙　梔子

靜嘉堂文庫所藏

蒲黃各一兩　當歸一兩半　黃芩二兩

右七味擣篩蜜和丸飲服六十丸日三夜一服立定破血止痢忌如常法

救急療產後下痢赤白腹中絞痛方

芍藥　乾地黃各四兩　甘草炙　阿膠炙

艾葉　當歸各二兩

右六味切以水七升煑取一升半去滓温分三服忌海藻菘菜蕪荑

必効療婦人新產後赤白痢心腹刺痛方

薤白切一升　當歸二兩　酸石榴皮三兩　地榆根四兩

粳米五合　一本加厚朴一兩　阿膠　人參

甘草炙　黃連各一兩半

右十味切以水六升煑取二升分三服忌如常法千金只用前五味

產後冷熱痢方二首

深師療產後冷熱痢黃連丸方

黃連三兩　烏梅肉一升熬　乾薑二兩

右三味擣末蜜丸如桐子以飲下二十至三十丸日再服忌猪肉

千金療產後忽著寒熱下痢生地黃湯方

甘草炙　黃連　桂心各一兩　生地黃五兩切

大棗二十枚　淡竹皮　赤石脂各一兩

右七味切以水一斗煑竹皮取七升去滓內藥煑取二升半分爲三服日三翼同忌猪肉冷水海藻菘菜生葱出第三卷中

產後痢日夜數十行方二首

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血桂枝湯方

靜嘉堂文庫所藏

桂心　乾薑　甘草炙各二兩　赤石脂十兩
當歸三兩　附子一兩炮　蜜一升
右七味切以水七升煑取三升入蜜一兩沸分服一升日三忌海藻菘菜生葱冷水

必効療產後痢日五十行者方

取木裏蠹蟲糞鐺中炒之令黃急以水沃之稀稠得所服之差止獨孤祭酒訥方

產後卒患淋方五首

廣濟療產後卒患淋小便磣痛乃至尿血方

冬葵子一升　石韋去毛　通草各三兩　滑石四兩末湯成下
茯苓　子芩各二兩
右六味切以水九升煑取三升絞去滓一服七合差止忌熱麪酢物

集驗療產後卒患淋石韋湯方

榆白皮五兩　石韋去毛　黃芩各二兩　通草三兩
大棗二十枚　葵子一升　白朮一兩
右七味切以水八升煑取二升半分爲三四服忌酒麪桃李雀肉等千金有甘草生薑爲九味

千金療產後淋瀝葵根湯方

葵根二兩乾者　車前一升　亂髮灰　大黃
桂心　滑石各一兩末後下　冬瓜汁七合　通草二兩
生薑六兩
右九味切以水七升煑取二升半去滓分三服出第三卷中

又產後淋滑石散方

滑石五分研　通草　車前子　葵子各四分
右四味以漿水服方寸匕至二匕爲妙

靜嘉堂文庫所藏

千金翼療產後卒淋氣淋血淋石淋湯方

石韋去毛 黃芩 通草各二兩 榆白皮五兩 大棗三十枚

甘草一兩炙 葵子二升 生薑 白朮各三兩

右九味切以水八升煮取二升半分三服千金同

廣濟療產後小便不禁兼數方四首

產後小便不禁方

取雞尾燒作灰酒服方寸匕日三服

小品療產後小便不禁方

取雞子燒作灰酒服日三

又療產後遺尿不知出方

白薇 芍藥各一分

右二味擣散以酒服方寸匕日三千金翼各十分

千金翼諸產後小便數桑螵蛸湯方

桑螵蛸三十枚 鹿茸炙 黃耆各三兩 人參

甘草炙 牡蠣各二兩熬 生薑四兩

右七味切以水六升煮取二升半分三服日再差止忌海藻菘菜

集驗產後小便數兼渴方一首

產後小便數兼渴栝樓湯方

桑螵蛸炙 甘草炙 黃連 生薑各二兩

栝樓 人參各三兩 乾棗五十枚

右七味切以水七升煮取二升半分三服忌猪肉冷水海藻菘菜

產後渴方二首

集驗療產後渴栝樓湯方

栝樓四兩 麥門冬去心 人參各三兩 乾地黃三兩

靜嘉堂文庫所藏

甘草二兩炙　乾棗二十枚　土瓜根五兩

右七味切以水八升煑取二升半分三服忌海藻菘菜蕪荑

千金療產後虛渇少氣力竹葉湯方

竹葉三升切　甘草炙　人參　茯苓各一兩

小麥五合　生薑　半夏洗各三兩　乾棗十五枚

麥門冬五兩去心

右九味切以水九升先煑竹葉小麥生薑棗取七升去滓內藥再煎取二升半絞去滓一服五合日三夜一忌羊肉海藻菘菜餳出三卷中

許仁則產後方一十六首

第一產後若覺血氣不散心腹刺痛脹滿喘急不能食飲宜依此方

鬼箭羽折之如金色佳　當歸　白朮　生薑各三兩

細辛　桂心各二兩　生地黃汁五合

右七味切以好無灰酒三升水四升和煎緩火火不要急煎取二升三合去滓温分服三合忌如常法

第二產後若覺惡露下多心悶短氣貼然無力不能食宜依此方

當歸　艾葉　生薑各三兩　乾地黃四兩

人參一兩　地榆二兩

右六味切以水七升半煎取二升四合去滓分温服八合日三

第三產後惡露下多少得所冷熱得調更無餘狀但覺腹內切痛可而復宜依此方

當歸五兩　生薑六兩　桂心三兩　芍藥二兩

右四味切以水酒各三升半煑取二升三合去滓分温三服之忌生葱

第四產後諸狀無所異但不能食者宜依此方

靜嘉堂文庫所藏

白朮五兩 生薑六兩

右二味切以水酒各二升緩火煎取一升半分温二服忌桃李雀肉等

第五産後更無他狀但覺虚弱欲得補氣力兼腹痛宜羊肉當歸湯方

肥羊肉一斤去脂膜 當歸五兩 生薑六兩 黄耆四兩

右四味切以水一斗緩火煮羊肉取八升澄清内藥煮取二升半去滓温分服若覺惡露下不盡加桂心三兩惡露下多覺有風加芎藭三兩覺有氣加細辛二兩覺有冷加吴茱萸一兩覺有熱加生地黄汁二合

第六産後惡露雖下甚通利遂覺心腹滿悶脅肋脹妨兼欬喘息急不能食飲大便不通眼澀坐起不穩心腹時時痛宜服此方

白朮 當歸 桑白皮 大黄各三兩

生薑四兩 細辛 桂心各二兩

右七味切以水八升煮取二升六合去滓分温三服此湯當得利利又不宜過多事不獲已所以取微利緣初産舉體皆虚尚藉藥食補之豈宜取利此緣病熱既不可勿以常途此湯得通氣息安貼利脱未即止湏斷之取三兩匙酢飲飲之即止適寒温將攝佳忌桃李雀肉生葱生菜

如利後諸候不減宜依後方

當歸十分 白朮八分 甘草炙七分 生薑

桑根白皮各六分 桂心三分 人參三分 細辛四分

右八味擣篩蜜丸桐子大以酒下十五至二十丸忌如常法

第七産後患水痢宜依此方

神麴末五合熬六月六日者 人參四分 枳實炙六分 赤石脂十分

静嘉堂文庫所藏

白朮（大分）

右五味擣散飲下方寸匕漸漸加之忌桃李雀肉等

第八産後患血痢宜依此方

艾葉（虎掌者三月三日五月五日者熱） 黃蘗 芍藥

甘草（炙各六分） 阿膠（十七分） 黃連（七分） 地榆（五分）

右七味擣散以飲下方寸匕甚妙忌如常法

第九産後患膿痢宜依此方

附子（炮） 蜀椒（汗） 乾薑（各五分） 甘草（炙六分）

赤石脂 黃耆（各十分） 白朮（七分）

右七味擣散飲服方寸匕加一匕半日再忌猪肉冷水海藻菘菜桃李雀肉等

第十産後諸痢方

取雞白煮炙食之唯多益好肥羊肉去脂作炙食之唯多益好以羊腎炒雞白食之良

第十一産後腹内安穩惡露流多少得所但縁産後日淺久坐視聽言語多或運勞力遂覺頭項及百肢節皮肉疼痛乍寒乍熱此是蓐勞宜依此方

猪腎（一具去脂） 當歸 芍藥 生薑（各三兩）

桂心（一兩） 葱白（三合）

右六味切以水八升緩火煮腎取六升澄清内諸藥煮取二升分温再服亦可用臘熏汗出即差

第十二産後覺患風手足不多隨和言語不多流利恍惚多忘精神不足宜依此方

獨活（三兩） 當歸 芍藥 防風

芎藭 玄參（各二兩） 桂心（一兩半）

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服如一劑覺安

靜嘉堂文庫所藏

穩隔三日又服一劑若一兩劑後漸差但須適寒溫將息
如未全差即以此方作丸有熱加乾葛五兩有冷加白朮
五兩有氣加生薑六兩有痛加當歸芍藥各二兩不能
食加人參二兩玄參四兩覺手足不穩加牛膝五加皮萆
薢各三兩黃耆四兩丸服忌生葱桃李雀肉等

第十三產後更無餘苦但覺體氣虛宜服此方

當歸 乾地黃各十分 澤蘭熬八分 防風
黃耆 續斷各六分 桂心 人參
地骨皮 芍藥各七分 乾薑六分

右十一味擣末蜜丸桐子大酒下二十丸忌生葱蕪荑

第十四產後不論服藥直爾不宜食諸生冷陳久滑物若服
藥彌須將息每方服藥後合蹤忌食法爲欲録其都要不能
一一具言諸方有白朮忌桃李細辛忌生葱甘草忌菘菜海藻
枸杞忌狗肉附子黃連忌猪肉桂心忌生葱

第十五產後血氣不多通散當時不甚覺之在蓐雖小不和出
則成痼結少腹疼硬乍寒乍熱食飲不爲肌膚心腹有時刺痛
口乾唾粘手足沈重有此狀宜依此方

當歸 芍藥 人參 甘草炙
鬼箭羽 牛膝各五分 牡丹皮六分 白朮六分
桂心 白薇 烏梅熬各四分 大黃八分
䗪蟲熬去翅足 水蛭熬各三分 蒲黃三分 朴消
赤石脂各十分 乾地黃七分 虎杖六分

右十九味擣末蜜丸桐子大酒服二十丸日再加二十五丸良忌
如常法

第十六產後膿血痢相兼宜依此方

赤石脂 五色龍骨 黃連各十分 阿膠炙

靜嘉堂文庫所藏

黃耆(各六分) 黃蘗(四分) 白朮(五分)
右七味擣末蜜丸桐子大飲下三十丸散服亦妙鄉前服法忌
桃李猪肉

產後遺糞方三首

廣濟療產後遺糞方
取故燕巢中草燒末以酒下半錢亦治男子

集驗療產後遺糞方
取礬石燒牡蠣熬各等分下篩酒服方寸日三亦治男子

又療產後遺糞不知出時方
白斂 芍藥(各二分)
右二味擣爲散以酒服方寸匕

產後陰道開方二首

廣濟療產後陰道開不閉方
取石灰一升熬令能燒草以水二升投灰中適冷煖
入水中坐漬須臾復煖坐如常法用之

集驗療婦人產後冷玉門開不閉硫黃洗方
石硫黃(研) 蛇牀子(各四分) 菟絲子(五分) 吳茱萸(六分)
右四味擣散以湯一升投方寸匕以洗玉門差止

產後陰下脫方六首

集驗療婦人產後陰下脫方
取蛇牀子一升布裹炙熨之亦療陰中痛

千金療產後陰下脫方
以鐵精粉上推內之

又方
燒人屎末酒服方寸匕日三度

又方
臍下横文灸二七壯

古今錄驗療產後陰下脫方

靜嘉堂文庫所藏

蜀椒一升　吳茱萸二升　戎鹽如半雞子大

右三味擣以綿裹如半雞子大内陰中日一易二十日愈

又方

鼈頭二枚陰乾　葛根一斤

右二味擣散酒服方寸匕日三

八瘕方一十二首

素女經論婦人八瘕積聚無子斷絶不産令有子受胎養法并曾傷落依月服藥法及陰閉生息肉陰痒生瘡陰痒蠹瘡帶下陰子藏不正陰門挺出陰腫堅隱疾方

黄帝問於素女曰吾聞天下婦人産乳有子而病者未曾生子而病者又産乳後而中絶不復産者何也諸病從生而令婦人腹中有積聚胷脅腰背攣而痛久而生八瘕之聚病深可畏不在腸胃療之或者已復其狀寧可得聞之乎對曰婦人之病皆由於月病生産所致又從胞胎所起其病不同鍼炙食藥不得其方也

黄帝曰安心其要易聞之為寶受之良久詳思念其事曰善哉療將奈何素女曰誠為主説婦人胞胎之數皆在陰重裹萬物皆從生淵深血脉精氣所從行腎為陰陰主開閉左為胞門右為子户主定月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入合於中黄門玉門四邊主持關禁開子精臍下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從止然婦人經脉俞絡合調則月水如時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絶不通其人思惟邪氣便得往來入合於子藏若生惡露未已合陰陽即令婦人經脉攣急令人少腹重裹急支滿胷脅腰背相引痛苦四肢酸削飲食不調結牢惡血不除月水不如時或在前或在後乍久不止因生積聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢寒熱四肢不欲時動陰中生氣腫肉生

靜嘉堂文庫所藏

風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月病即不復生子
黃帝曰吾深所憂也療之柰何可得愈病令人有子願拜受藥
其人不敢傒傳何以神良耳素女曰今詳面圖
一曰黃瘕黃瘕者婦人月水始下若新傷墮血氣未止卧寢未
定五藏六腑虛羸精神不定因向大風便利陰陽開閉關節四
遠中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃
瘕之聚令人病苦四肢寒熱身重淋露卧不欲食左脅下有氣
結牢不可得抑苦病腰背相引痛月水不利則善令人不產少
腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黃汁病苦如此
令人無子療當刺關元氣衝行以毒藥有法療瘕當下即愈矣
又療黃瘕皂莢散導之方
皂莢一兩炙去皮子　蜀椒一兩汗　細辛六分
右三味擣散以三角囊大如指長二寸貯之取內陰中欲[illegible]

悶則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男
子忌生菜等
二曰青瘕青瘕者婦人新生未滿十日起行下以湯浣洗太蚤
陰陽虛玉門四邊皆解散子戶未安定骨肉皆痛手臂不舉飲
食未復內藏吸吸又當風卧不自隱爲障若居濕地及濕席令
人苦寒洒洒入腹中心腹煩悶沈淖惡血不除結熱不得散則生
青瘕之聚在左右脅下藏於背膂上與肩甲腰下攣急兩足腹
下有氣起喜唾不可多食四肢不欲動搖恍惚善夢手足腫
面目黃大小便難其候月水不通利或不復禁狀如崩中此自過
所致令人少子療之當刺胃管行以毒藥有法瘕當下即愈矣
又療青瘕導藥方
戎鹽一升　皂莢半兩去皮子炙　細辛一兩六銖
右三味擣散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但卧瘕

靜嘉堂文庫所藏

當下青茹葵汁養之如產法

三日燥瘕燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾步若舉重移輕汗出交流氣力未平而卒以恚怒致腹中猥咽不泄經脈攣急內結不舒煩滿少力氣上達膈中背膂少腹壅急月水與氣俱不通利而反以飲清快心月水橫流溢入他藏不去有熱則生燥瘕之聚大如半柸上下腹中苦痛在兩脅下上引心而煩害飲食欲嘔吐胃及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足酸削久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便澀難有此病者令人少子療之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘕當下即愈矣

又療燥瘕方

大黃（如雞子許） 乾薑（二兩） 黃連（三兩） 雞膍胵中黃膜（一枚炙）

桂心（一尺） 䗪蟲（三枚熬） 厚朴（十銖炙） 郁李人（一兩去皮尖熬）

右八味擣散早朝空腹以溫酒一盞和三錢匕頓服瘕當下下畢養之如產婦法三月無子者當有三日勿合陰陽

四曰血瘕血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣盛溢入他藏若大飢寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下走腸胃之間流落不去內有寒熱與月水合會則生血瘕之聚令人腰痛不可以俛仰橫脅下有積氣牢如石少腹裏急苦痛背膂疼腰股下痛陰裏若生子風冷子門僻月水不時乍來乍去有此病者令人無子療之瘕當下即愈矣（方闕）

崔氏療婦人血瘕痛方

乾薑 烏賊魚骨（各一兩炙） 桃人（一兩去皮尖熬）

右三味擣散酒服二方寸匕日二

又方

取古鐵秤鎚或大斧頭或鐵杵以炭火燒令赤投好酒三升中稍稍飲之

靜嘉堂文庫所藏

又方　桂末温酒服方寸匕佳日二並出第十下卷中

古今録驗療婦人血瘕攻刺腹脅時痛導藥方

大黄　當歸各半兩　山茱萸一兩　皁莢一兩去皮子炙

細辛　戎鹽各六銖

右六味擣以香脂丸如指大每以綿裹内陰中正坐良久瘕當下養如乳婦之法

五曰脂瘕脂瘕者婦人月水新若生未滿三十日其人未復以合陰陽絡脉分胞門傷子戸失禁關節散五藏六腑津液流行陰道瞤動百脉關樞四解外不見其形子精與血氣相遇犯禁子精化不足成子則生脂瘕之聚令人支滿裏急痛痺引少腹重腰背如刺四肢不舉飲食不甘卧不安席左右走腹中切痛時差時甚或時少氣頭眩身體疼解苦寒惡風膀胱脹月水乍來乍去不如常度大小便血不止有此病者令人無子療之當刺以長鍼行以毒藥瘕當下即愈矣

又療脂瘕方

皁莢十八銖去皮炙　礬石六銖燒　五味子　蜀椒汗

細辛　乾薑各半兩

右六味擣散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘕乃愈

又療婦人絶不復生及未曾生皆以脂瘕腹中有塊以湯煎自下尚不受子導散方

皁莢炙去子皮　呉茱萸一　當歸各一兩　蜀椒汗各二兩

細辛熬　礬石燒　五味子各三分　大黄

戎鹽各二兩　乾薑二兩

右十味擣散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿内陰中坐卧隨意勿行走小便時去之別換新者

靜嘉堂文庫所藏

六曰狐瘕狐瘕者婦人月水當日數來而反悲哀自恐若以遠行逢暴風疾雨雷電驚恐衣被濕沈罷(音疲)倦少氣心中恍惚未定四肢懈墮振寒若寤寐脉氣絶精神游亡邪氣入於陰裏不去則生狐瘕之聚食人子藏令人月水閉不通少腹瘀滯背膂腰背痛陰中腫小便難胞門子戶不受男精五藏氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多所思如有身狀四肢不舉有此病者終身無子其瘕有手足卒成形者殺人未者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下即愈矣

又療狐瘕方

取新死鼠一枚裹以新絮塗以黃土穿地坎足沒鼠形置其中桑薪灼其上一日一夜出分去絮內桂心末六銖酒服二方寸匕病當下甚者不過再服差止

七曰蛇瘕蛇瘕者婦人月水已下新止適閉未復胞門子戶勞動陰陽未平榮衛分行若其中風暴癘羸劣飲食未調若起行當風及度泥涂因衝寒太早若坐濕地名曰陰陽亂腹中虛若遠行道路伏飲汙井之水不潔之食通吞蛇鼠之精流落不去則生蛇瘕之聚上食人之肝心其病長大條條在臍下上還絞左右脅不得吐氣兩股脛間苦疼少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中攣急腰背俱痛難以動作喜發寒熱月水或多或少有此病者不復生子其瘕手足成形者殺人未者可治之療有法度行以毒藥瘕當下即愈矣

又療蛇瘕方

大黃　黃芩　芒消(各半兩)　甘草(大如指一尺炙)

烏賊魚骨(二枚)　皂莢(六枚去皮子炙)

右六味擣以水六升煑之三沸下絞去滓下消適寒溫服之十日一劑空腹服之當下

靜嘉堂文庫所藏

八曰䵟瘕䵟瘕者婦人月水新至其人劇作罷音疲勞汗出衣服潤濕不以時去之若當風睡足踐濕地恍惚覺悟蹠立未安顏色未平復見所好爲開蕩魂魄感動五內脫消若入水浣洗沐浴不以時出而神不守水氣與邪氣俱入至三焦之中又暮出入或門先閉津液妄行留落不去則生䵟瘕之聚大如小柸令人少腹內切痛惡氣左右走上下腹中苦痛若存若亡持之躍手下引陰裏腰背亦痛不可以息月水不通面目黃黑脫聲少氣有此病者令人絕子其瘕有手足成形者殺人未者可治之療有法度以長鍼按療之行以毒藥瘕當下即愈矣

又療䵟瘕方

大黃六分　乾薑　側子各半兩　附子

人參各九銖　䗪蟲一寸七熬　桂心一兩六銖　細辛

土䱉各十八銖　白朮一兩

右十味擣散以酒服方寸匕日三以上八般瘕疾出古今錄驗第三十卷中

肉癥方二首

集驗療婦人臍下結堅大如柸升月經不通寒熱往來下痢羸瘦此爲癥氣不可療未生癥者可療方

生地黃三十斤取汁　乾漆一斤熬

右二味擣漆爲散內地黃汁中微火煎令可丸酒服桐子大三丸至七八丸即止

刪繁療女人子門不開血聚腹中生肉癥䅵䅵如物此呼爲癥氣藏寒所致生地黃煎破血丸方

生地黃汁一斗　生牛膝汁一斗　乾漆一斤半熬

右三味擣漆爲散內地黃等汁中攪微火煎取堪爲丸止停攪丸如梧子一服三丸以酒服日再若覺腹內過痛食後乃

靜嘉堂文庫所藏

服之

婦人崩中方一十一首

小品療婦人崩中晝夜十數行醫所不能療方

芎藭八兩

右一味切以酒五升煑取三升分三服不飲酒水煑亦得

千金療崩中方

白茅根二斤　小薊根五斤

右二味切以酒五升煑取四升分稍稍服

又療婦人白崩中方

芎藭　阿膠炙　桂心　赤石脂

小薊根各二兩　乾地黃四兩　伏龍肝雞子許七枚

右七味切以酒六升水四升煑取三升去滓內膠令烊分爲三服日三並出第四卷中

千金翼療婦人白崩中馬通方

白馬通汁二升　乾地黃四兩　伏龍肝如雞子大七枚　桂心

芎藭　阿膠炙　小薊根　白石脂各二兩

右八味切以酒七升合馬通汁煑取三升去滓內膠令烊分服日三

又療婦人崩中及痢一日一夜數十起大命欲死多取諸根煎丸得入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多仍合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得二斛爲佳薔薇根煎方

懸鉤根　薔薇根　柿根　菝葜各一斛

右四味剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煑使三分減一去滓無大釜稍稍煑如初法都畢會汁煎取可丸丸如梧桐子酒服十丸日三良並出第八卷中

文仲療婦人崩中漏下去青黃赤白使人無子方

靜嘉堂文庫所藏

禹餘粮研　赤石脂研　牡蠣熬研　桂心

烏賊魚骨　竈下黃土各等分

右六味爲散以清酒服方寸匕日二服忌生葱

又方

鹿茸炙　當歸各二兩　蒲黃一升

右三味擣散酒服五分匕日三度

又方

取好書墨爲末二匕若燒露蜂房末三指撮酒服之

又方

常炙猪腎食之並出第九卷中

必効療崩中方

丁香百顆　好酒一大升

右二味煑取三兩沸去滓頓服

又療婦人崩中無久近悉主之方

伏龍肝一斤先於盆中以水二斗研令碎澄清取一斗二升用煑諸藥　小薊根　寄生　續斷

地榆　艾葉各三兩　阿膠　當歸

赤石脂研　厚朴炙各二兩　生薑五兩

右十味切以伏龍肝水煑取三升絞去滓分三服忌如常法

崩中去血方一十三首

廣濟療崩中去血日數升方

龍骨研　赤石脂研各六分　烏賊魚骨　牡蠣粉

肉蓯蓉各五兩　龜甲炙　芍藥　續斷各八分

右八味擣散飲服方寸匕日三漸加之加乾地黃十分佳

又療崩中下血不止并主男子卒痢血方

取東南引桃枝三握細剉以水四升煑取一升頓服末差更服良

删繁療婦人崩中泄血不斷淋瀝連年不絕黃瘦傷損芍藥散方

芍藥四分　牡蠣熬　乾地黃　白术

靜嘉堂文庫所藏

乾薑　烏賊魚骨　附子炮　桂心
黃耆　龍骨各八分研
右十味擣散酒服方寸匕良
小品療崩中去血方
春生薊根汁一升温服之亦可以酒煑隨意用之
又療婦人暴崩中去血不息方
牡蠣熬令赤　兎骨炙各十分
右二味擣篩爲散以酒服方寸匕妙
集驗療婦人女子忽暴崩中血不斷或如鵝鴨肝者方
小薊根六兩　阿膠炙　當歸　芎藭
續斷　青竹茹各三兩　竈中黃土綿裹　地榆根各四兩
生地黃八兩　赤馬通汁一升
右十味切以水八升合馬通汁煑取二升半分爲三服未全止服

三四劑後服此丸方
續斷　甘草炙　鹿茸炙　小薊根
丹參各五分　乾地黃十分　芎藭　阿膠炙
青石脂　當歸　地榆各六分　栢葉熬四分
秦牛角鰓炙黃　龜甲炙令黑各十二分
右十四味擣篩蜜丸如桐子以酒服十丸日再加至三十丸忌如
常法千金同
千金療婦人崩中去血積時不止起死人方
肥羊肉三斤去脂　乾薑　當歸各三兩　生地黃汁二升
右四味切以水二斗煑羊肉取一斗三升下地黃汁合藥煑取
三升分爲四服尤宜羸瘦之人服妙
又療崩中去血產後餘疾丹參酒方
艾五斤　生地黃　地榆各五斤　丹參五斤　忍冬五斤

靜嘉堂文庫所藏

右五味合擣之以水漬三宿去滓煮取汁以糯米一石釀酒飲服之

又温經湯療崩中去血一斗服之即斷月水過期不來者服之亦佳方

吳茱萸三兩　麥門冬一升去心　半夏八兩　當歸

芎藭　人參　芍藥　牡丹

桂心　阿膠炙　生薑　甘草各二兩炙

右十二味切以水一斗煮取三升分服忌羊肉生葱海藻菘菜等並出第四卷中

千金翼療婦人崩中去血不止薊根酒方

大小薊根各一斤酒一斗漬五宿任意多少服之良

又療婦人崩中下血欅柳葉湯方

欅柳葉三斤　麥門冬去心　乾薑各二兩　甘草一兩炙

乾棗十枚擘

右五味切以水一斗煮欅柳葉取八升去滓內藥煮取三升分三服日三並出第八卷中

救急療崩中下血數斗氣欲絶方

伏龍肝五升　人參二兩　麝香二兩　生薑四兩

右四味切以水一大斗煮土取二升下藥煎取一升半更別研伏龍肝一雞子許并香內湯中攪令調分服

帶下方一十首

廣濟療帶下病方

芍藥七大兩熬令黃黑爲散以酒服三錢匕

千金療帶下方

枸杞根一斤　生地黃五斤

右二味切以酒一斗煮取五升分爲三服

靜嘉堂文庫所藏

又方　燒牛角末酒服方寸匕日三

又方　桑耳燒令黒酒服方寸匕日三

又方　豉酒亦佳

又方　燒馬左蹄末酒服方寸匕日三

又方　燒狗頭骨灰亦佳

又方　以水煑甑帶汁服之亦佳並出第四卷中

救急療帶下方

以竈下黄土水和爲泥作彈子丸百枚暴乾以火燒熱㓕以三年酢漬一丸綿裹内玉門中唯深待冷即易之新患者三十丸差久者五十丸餘皆曰知即佳

必効療婦人帶下方

取兎皮燒令煙斷爲末酒服方寸匕妙

婦人虚羸及月病不能食方三首

千金療婦人虚羸短氣胷脅逆滿風氣石斛生地黄煎方

石斛　甘草炙　紫菀各四兩　桂心二兩

生地黄汁　淳酒各八升　茯苓一斤　大黄八兩

麥門冬二升去心　桃人半升去皮尖熬

右十味擣末合盛銅器中加炭火内鹿角膠一斤數攪之得一升次内飴三斤白蜜三升合和調更於銅器中釜湯上煎攪之以生竹抄無令著器攪令盡相得藥成先食酒服如彈丸日

又鍾乳澤蘭丸主婦人久羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷不能食面目瘀黒憂恚百病悉主之方

澤蘭九分　芎藭　甘草炙　山茱萸

白芷　牛膝　當歸　署預

藁本各五分　柏子人　人參　乾地黄

麥門冬去心　石膏　石斛各六分　細辛

靜嘉堂文庫所藏

桂心各四分　蕪荑二分　艾葉三分

右十九味擣篩蜜和丸如桐子大服二十丸加四十丸酒下忌如常法

並出第四卷中

救急療婦人月病不調或一月不來或隔月不來或多或少脐下絞痛面色痿黄四體虚吸羸瘦不能食方

當歸　牛膝　桃人去皮尖　牡丹皮

大黄別漬各三兩　芎藭　土瓜根各二兩　芍藥

朴消　桂心各二兩　䗪蟲去翅足熬　水蛭熬各半兩

右十二味切以水九升煮取三升分温服忌如常法

婦人陰蝕及疳方八首

千金療陰蝕瘡方

當歸二兩　地榆三兩　甘草炙　芎藭

芍藥各二兩

右五味切以水五升煮取二升洗之日三夜一

又方

蒲黄一升　水銀一兩

右二味研之以粉上

又方

肥猪肉三十斤以水三石煮取熟去肉入盆中浸之冷即易不過三兩度並出第三卷中

崔氏療陰蝕洗搨湯方

甘草炙　乾漆熬各一兩　黄芩　乾地黄

芍藥　當歸各二兩　龜甲炙五兩

右七味切以水七升煮取半去滓以綿帛内湯中以搨瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即裛乾捻取甘濕散薄付瘡上使遍可經半日又以湯搨搨訖如前傅藥其内甘濕散是蚺蛇膽等六味者是在余療甘濕卷中余家婢遇此疾就甘家療不差蝕處作兩瘡深半寸余於涓子方中檢得此

靜嘉堂文庫所藏

甘草湯方仍以自與蚺蛇膽散用不經七日瘡乃平復甚効凡救
十八人手下即活遇斯疾者請廣流布傳之出第十卷中

又療𤸷頻用大効方

蚺蛇膽眞者研　青木香　石硫黃研　鐵精
麝香各四分　舊用五月五日蝦蟆麝香臨時分之多少入用緑麝香辟蛇毒若先以相和蛇膽即無力也

右六味等分擣篩爲散更細研有患取如三棊子和井花水日再服服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取散如二棊子内竹管裏深吹入下部中亦日再老小量減其熏法每日一度不用再爲之甚良

又療𤸷蟲食下部及五藏方

取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿纏之又擣石硫黃爲末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一短竹筒先内下部中仍以所撚藥桃枝熟然熏之並出第三卷中

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟆兎屎等分末傅之瘡上良

古今録驗療婦人陰蝕苦中爛傷狼牙湯方

狼牙三兩㕮咀以水四升煑取半升去滓内苦酒如雞子中黃一柸沸湯消夜適寒温以綿濡湯以瀝瘡中日四五度即愈

陰中腫痛方四首

肘後療陰中腫痛方

灸枳實以熨之

經心録療婦人陰中腫痛不可近者湯洗方

防風三兩　大戟二兩　艾五兩

靜嘉堂文庫所藏

右三味切以水一斗煮取五升温洗陰中日可三度良

古今錄驗療婦人陰腫堅痛礬石散方

礬石（二分熬）　甘草（半分炙）　大黃（一分）

右三味擣篩取棗大綿纏導陰中二十日即愈

又療婦人陰腫苦瘡爛麻黃湯洗之方

麻黃（去節）　黃連　艾　蛇牀子（各二兩）

酢梅（十枚）

右五味切以水一斗煎取五升洗之

陰中瘡方五首

集驗療婦人陰中痛生瘡方

羊脂（一斤）　當歸　杏人（去皮尖）　白芷

芎藭（各一兩）

右五味細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆一枚綿裹

藥內陰中日一度

肘後療女子陰中瘡方

末硫黃傅瘡上

又療女子陰中瘡方

杏人（燒末）　雄黃　礬石（各二分燒）　麝香（半分）

右四味和傅之日三度

古今錄驗療婦人陰中生瘡黃芩湯洗方

當歸　黃芩　芎藭　大黃

礬石（各二分）　黃連（一分）　雄黃（二分）

右七味切以水五升煮取四升洗瘡日三度

又療婦人陰中生瘡雄黃散方

芎藭　藜蘆　雄黃（研）　丹砂（研）

蜀椒（汗）　細辛　當歸（各一分）

靜嘉堂文庫所藏

右七味擣篩散取方寸匕綿裹內陰中又傅外瘡上忌如常法

陰痒方五首

廣濟療苦産門痒無計方

蚺蛇膽研　雄黃研　石硫黃研　朱砂研

峭粉　藜蘆　蕪荑各二分

右七味擣細篩重羅令調以臘月猪脂和如泥取故布作篆子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易時宜以猪椒根三兩煑湯洗乾拭內藥佳

崔氏療陰痒痛不可忍方

取蒜隨多少水煑作湯洗之日三

又方

取狼牙蛇牀子煑作湯洗日三

又方

取杏人燒作灰承熱綿裹內陰中良並出第十卷中

經心錄療陰痒方

枸杞根一斤水三升煑十沸適寒溫洗之

陰中痒有蟲方六首

千金療人陰蝕瘡方

以肥猪肉十斤以水煑肉令爛去肉以湯令極熱便灌瘡上冷易之

又方

取狼牙兩把以水五升煑取一升洗之日五六度並出第三卷中

崔氏療陰痒似有蟲狀煩悶眞丹散方

眞丹一分研　礬石三分燒研　芎藭四分

右三味爲散以㲉囊盛著陰中蟲當死盡

又陰痒有蟲方

取雞肝去脂及熱內陰中蟲當盡死並出第十卷中

古今錄驗療陰痒有蟲方

靜嘉堂文庫所藏

取牛肝截五寸綿頭內陰中半日蟲入肝出之豬肝亦得

又療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少氣思美食方

用生鯉魚長一尺去頭取骨擣末熬黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛處即止

陰下脫方四首

廣濟療陰下脫出方

皂莢去皮子炙 半夏洗 大黃 細辛各四分

蛇牀子六分

右五味擣散薄絹袋盛如指大內陰中日二易又以羊脂已煎煑遍塗上以鐵精傅脂上多少令調以火炙布令煖以熨之

研磁石酒服方寸匕日三服

集驗療婦人陰下脫散方

當歸 黃芩 牡蠣熬各二兩 芍藥一兩半

猬皮一兩切熬

右五味擣散酒服方寸匕日三服禁舉重良千金同

千金療陰下脫硫黃散方

硫黃研 烏賊魚骨各二分 五味子三銖

右三味擣散以粉上日三出第三卷中

千金翼療諸婦人陰下脫方

細研礬石酒服方寸匕日三服出第六卷中

陰挺出方三首

廣濟療婦人子藏挺出數痛洗方

蛇牀子一升 酢梅十四枚

右二味以水五升煑取二升半洗痛處日夜十過良

又方

烏頭炮 白及各四分

靜嘉堂文庫所藏

右二味擣散取方寸匕以綿裹內陰中令入三寸腹內熱即止月一度著明晨仍須更著以止爲度
集驗療婦人陰下挺出方
蜀椒　烏頭　白及各二分
右三味擣篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱明旦更著差止千金同
集驗療女人傷於丈夫四體沈重噓吸頭痛方
女人傷丈夫頭痛方二首
生地黃八兩　芍藥五兩　香豉一升　葱白切一升
生薑四兩　甘草二兩炙
右六味切以水七升煑取二升半分三服不得重作慎房事
千金同
千金翼療諸婦人傷丈夫若頭痛欲嘔悶桑白皮湯方
桑根白皮半兩　乾薑二累　桂心五寸　大棗二十枚
右四味切以酒一斗煑三四沸去滓分溫服之適衣無令汗出千金同出第八卷中
交接輒血出痛方二首
千金療女人交接輒血出方
桂心二分　伏龍肝二分
右二味擣末以酒服方寸匕差止出第三卷中
崔氏療合陰陽輒痛不可忍方
黃連六分　牛膝　甘草炙各四分
右三味切以水四升煑取二升洗之日三四度差止出第十卷中
童女交接他物傷方三首
集驗療童女交接陽道違理及他物所傷犯血出流離不止方
取釜底墨斷葫蘆以塗之

靜嘉堂文庫所藏

又療童女交接陽道違理血出不止方
燒髪并青布末爲粉塗之
割雞冠取血塗之
又方
小戶嫁痛方四首
千金療小戶嫁痛連日方
甘草三分炙 芍藥二分 生薑三分 桂心一分
右四味切以酒二升煑取三沸去滓分温服之神良出第三
卷中
千金翼療小戶嫁痛單行方
牛膝五兩
右一味切以酒三升煑再沸分三服
又療婦人嫁痛單行大黃湯方
大黃三兩
右一味以酒一升煑一沸頓服
又療婦人小戶嫁痛烏賊魚骨散方
烏賊魚骨二枚燒爲屑酒服方寸匕日三並出第八
卷中
坐藥方三首
通眞論療婦人子門冷坐藥法
蛇牀子四分 茱萸六分 麝香二銖
右三味擣散蜜丸綿裹如酸棗内之下惡物爲度
近效坐藥主下冷子門痒閉方
吴茱萸 葶藶子熬各二分 蛇牀子三分 無食子一枚
右四味爲散以綿裹如棗許内子宮中令熱爲度
又方
遠志二分 蛇牀子 五味子各四分 乾薑
蓮花葉各三分

靜嘉堂文庫所藏

右五味擣散以白中王泉和兎矢太內陰門中去吟內熱良

夏侯拯録

婦人欲斷產方四首

小品斷產方

故布方圓一尺燒屑以酒飲服之終身不產千金云蠶子故布

又療姙身欲去之并斷產方

栝樓　桂心各三兩　豉一升

右三味切以水四斗煮取一升半分服之

又方

附子二枚擣爲屑以淳苦酒和塗右足去之大良

千金斷產方

油煎水銀一日勿息空肚服棗大一丸永斷不損人

外臺祕要方卷第三十四　迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔　校勘

靜嘉堂文庫所藏